

Miehen sterilisaatio

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Toimenpide

Toimenpide tehdään yleensä paikallispuudutuksessa. Tarpeen vaatiessa voidaan antaa rauhoittavaa ja kipua lievittävää lääkettä. Toimenpiteessä yhdestä tai kahdesta kivespussiin tehtävästi viillosta otetaan siemenjohtimet esiin. Siemenjohtimista katkaistaan pieni pala patologille näytteeksi. Siemenjohtimien päät sidotaan tai poltetaan ja haavat suljetaan ompelemalla.

Toipuminen

Leikkauspäivänä on hyvä levätä. Seuraavasta päivästä lähtien liikkuminen on sallittua voinnin mukaan, mutta raskasta fyysistä räsitystä ja urheilua tulisi välttää kolmen päivän ajan leikkauksesta. Sairauslomaa kirjoitetaan työstä riippuen 1–3 päivää, mutta työnantaja voi myös vaatia, että päivät otetaan lomana tai muuna vapaana.

Haavanhoito

Haavalla olevat ompeleet ovat sulavia, niitä ei tarvitse poistaa. Leikkausalue tulee pitää kuivana vuorokauden, minkä jälkeen haavaa suihkutetaan pari kertaa päivässä viikon ajan välttämällä hankaamista. Alue kuivataan varovasti painelemalla. Saunaan saa mennä noin viikon kuluttua leikkauksesta. Leikkauksen jälkeen kivespussi saattaa olla turvonnut ja mustelmainen. Tämän vähentämiseksi on hyvä pitää kivesten tukena tiukahkoja, hyvin istuvia alushousuja 2–3 vuorokautta tai pidempään. Haava paranee noin 2 viikossa. Päivittäiset ilmakylvyt edistävät haavan paranemista.

Jälkihoito

Ehkäisytulokset varmistetaan siemennestenäytteellä noin 12 viikon kuluttua toimenpiteestä. Kotiutuessa saat mukaan näytepurkin, näytteenotto-ohjeen ja lähetteen siemennesteanalyysiin. Toimita näyte johonkin erillisessä ohjeessa mainituista laboratorioista. Tuloksen saat kirjeitse noin kahden viikon kuluttua näytteen jättämisestä. Siemennesteanalyysi sisältyy toimenpidemaksuun.

Normaali siemennestenäytteen vastaus onnistuneesta toimenpiteestä on joko ”puhdas näyte” tai ”muutama liikkumaton siittiö tai näkökenttä mikroskoopissa”. Mikäli tutkimustulos on

epävarma, sinuun otetaan yhteyttä kontrollinäytettä varten. Ehkäisyä tulee käyttää siihen asti, että toimenpiteen tulos on varmistettu siemennestenäytteellä.

Kivunhoito

Kipulääkkeeksi riittävät apteekista ilman reseptiä saatavat lääkkeet. Lääkkeitä on hyvä varata kotiin etukäteen.

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Yhteydenotot

Tulehdusoireiden (yltyvä kipu, voimakas turvotus, kuumotus, punoitus, jatkuva siteen läpi tuleva kosteus) tai muun ongelman (esimerkiksi haavassa on jatkuvaa runsasta verenvuotoa, kivekset turpoavat huomattavasti) ilmaantuessa tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen tai hoitavaan yksikköön.

Päiväkirurginen yksikkö, arkisin kello 07.00–15.00, puhelin 06 213 1552,

Urologinen hoitaja, tiistaisin ja torstaisin kello 08.30–09.00, perjantaisin kello 13.30–14.00, puhelin 06 213 5494,

Oma terveyskeskus tai työterveyshuolto

Sairaanhoidon puhelinneuvonta maanantaista torstaihin kello 15.00–08.00, perjantaisin kello 14.00–08.00 sekä vuorokauden ympäri viikonloppuisin ja arkipyhisin, puhelin 116 117

Vaasan sairaanhoitopiiri • www.vaasankeskussairaala.fi • Vaihde 06 213 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.