

Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Vid förträngning av handledskanalen kommer medianusnerven, som går igenom den, i kläm. Detta förorsakar symptom bland annat stickningar och domningskänsla i pek- och långfingret främst om natten. Om handens gripkraft försvagas kan man börja tappa saker. Man kan uppleva smärta i handleden vid kraftig böjning eller sträckning av handleden. Vid svåra besvär kan ett kirurgiskt frigörande av nerven utföras.

Ingrepp

Vid det kirurgiska ingreppet, som utförs under bedövning, läggs ett snitt i handled och handflata och man öppnar upp handledskanalen så att nerven frigörs. Vid långvarig kompression av nerven kan en del av symptomen kvarstå trots operation.

Konvalescens

Svullnad i operationsområdet fördröjer läkandet och förorsakar smärta. Fingerrörelser förbättrar muskelfunktionen och blodcirkulationen och minskar svullnad och kan inledas så fort bedövningen släppt. Svullnaden minskar också vid högläge av handen, även på natten till exempel med hjälp av en dyna samt med hjälp av anti-inflammatoriska smärtmediciner.

Handen kan användas fritt så långt smärtan tillåter i lättare vardagliga sysslor. Man bör dock undvika maximal böjning av handleden samt lyft av saker som väger mer än ett kilo ända till stygnborttagningen.

Sårvård

Förbandet som läggs i samband med operationen, för att förhindra av svullnad och vätskeutsöndring, bör ej blötas ned. Om förbandet är blodigt bör det bytas. Efter 1-4 dygn tas förbandet bort, och efter det får såret bli vått men ej blötläggas.

Stygnen tas bort efter två veckor vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning (____/____). Ett dygn efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu. 3-4 dagar

efter stygnborttagningen kan man börja smörja såret samt lätt massera det för att förbättra elasticiteten i ärrer.

Smärtbehandling

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1–4 dygn, därefter vid behov:

Paracetamol

Anti-inflammatorisk värkmedicin

Stark värkmedicin

Andra mediciner

Eftergranskning krävs inte i allmänhet.

Sjukledigheten är cirka 2–4 veckor beroende på arbetets art.

Tag kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

Den dagkirurgiska enheten vardagar klockan 07.00–15.00, telefon 06 213 1552,

Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

Telefonrådgivning måndagar till torsdagar klockan 15.00–08.00 och fredagar klockan 14.00–08.00 samt dygnet runt under helger och veckoslut, telefon 116 117

