

## Operation vid bröstcancer, borttagning av hela bröstet

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

### Ingrepp

Operationen görs under sövning. För att hitta portvaktslymfkörtlarna sprutar man in ett radioaktivt spårämne i bröstet på operationsmorgonen. Dessutom kan man lokalisera portvaktslymfkörtlarna med hjälp av ett blått färgämne, vilket har som bieffekt att urinen färgas blågrön. Laddade lymfkörtlar skickas under operationen till patologen för undersökning. Om man hittar cancermetastaser i lymfkörtlarna, avlägsnar man ytterligare lymfkörtlar från armhålan under samma operation. En drän sätts till operationsområdet.

### Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. Under sjukledigheten bör man undvika tyngre fysisk ansträngning. För att bevara rörelseomfånget i axeln och minska svullnad bör man använda en stödjande BH och utföra de rörelseserier som fysioterapeuten gett föreskrifter om. Fysioterapeuten får du träffa efter operationen. I samband med hemförlovingen får du en mjuk tygprotes, som kan användas i BH:n.

### Sårvård

De tjockare sårförbanden får tas bort dagen efter operationen och såren får duschas efter det. Såret har självabsorberande stygn. Sårtejpen kan tas bort efter en vecka. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen. Dränen kan tas bort vid hälsovårdscentralen enligt kirurgens föreskrifter, senast 7 dagar efter operationen. Efter att dränen tagits bort kan det ansamlas vätska under huden i operationsområdet. Vätskan kan avlägsnas (punkteras) med nål och spruta i samband med kontrollbesöket vid kirurgiska polikliniken. Om det ansamlats en stor mängd vätska som upplevs besvärande, redan före kontrollbesöket, kan man kontakta arbetshälsovårdens läkare för avlägsnande av vätskan eller boka tid till sårskötaren vid kirurgiska polikliniken, telefon 06 213 1533. Om det inte finns tecken på infektion i området, behöver punkteringen inte göras under jourtid och man behöver inte heller ta några laboratorieprov.

### Smärtlindring

Under operationens slutskede sätter man ofta bedövningsmedel lokalt i såret, vilket minskar smärtorna direkt efter operationen. Det är bra att ta värkmedicin regelbundet i 1–4 dygn efter operationen och sedan vid behov.

Paracetamol

---

Anti-inflammatorisk värkmedicin

---

Andra mediciner

---

Efterkontroll sker vanligen efter 3–4 veckor vid kirurgiska polikliniken. De slutgiltiga provsvaren fås i samband med kontrollen.

Sjukledighet är i allmänhet 2–3 veckor beroende på ingreppet och hur tungt arbete man har.

### **Kontaktuppgifter**

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör i första hand kontakta den vårdande enheten:

Dagkirurgiska avdelningen, vardagar klockan 07.00–15.00, telefon 06 213 1552

Den egna hälsovårdscentralen eller arbetshälsovården

Telefonrådgivning måndagar till torsdagar klockan 15.00–08.00 och fredagar klockan 14.00–08.00 samt dygnet runt under helger och veckoslut, telefon 116 117

Vasa sjukvårdsdistrikt • [www.vasacentralsjukhus.fi](http://www.vasacentralsjukhus.fi) • Växel 06 213 1111  
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.