

Calmette eli bcg-rokotus

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Suomessa Calmette eli BCG-rokotusta tarjotaan kaikille niille vastasyntyneille, joilla on suuri vaara saada tuberkuloositartunta. Lapsen vaara saada tuberkuloosi on lisääntynyt, jos

- hänen äidillään, isällään sisaruksellaan tai henkilöllä, jonka kanssa hän asuu, on joskus todettu tuberkuloosi,
- hän itse, hänen äitinsä, isänsä, sisaruksensa tai henkilö, jonka kanssa hän asuu, on syntynyt maassa, jossa tuberkuloosia esiintyy paljon,
- hän on ensimmäisen ikävuotensa aikana muuttamassa yli kuukaudeksi maahan, jossa tuberkuloosia esiintyy paljon.

Tuberkuloosia esiintyy paljon muun muassa lähes kaikkialla Afrikassa ja Aasiassa, suuressa osassa Etelä-Amerikkaa, Venäjällä ja Baltian maissa. Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta (www.thl.fi) voit hakea ajankohtaisen listan maista, jotka kuuluvat rokotuksen piiriin. Haun voit tehdä kirjoittamalla Hae-kenttään ”bcg”.

Calmette-rokotus (annettu lapsellesi _____ / _____) annetaan suojaamaan tuberkuloosilta. Se ei aiheuta lapselle kuumetta tai muita yleisoireita. Pistospaikkaan voi tulla noin yhden kuukauden kuluttua märkivä patti, joka tarvittaessa puhdistetaan puhtaalla vedellä. Tiivistä laastaria ei saa laittaa pistospaikan päälle, koska se paranee parhaiten avohoidossa. Rokote voi aiheuttaa myös nivusrauhasten turpoamista, mutta se ei vaadi mitään hoitoa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.