

Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO 4816)

Tutkimusta käytetään klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen virtsasta.

Tarvittavat välineet:


1. Virtsanäytteenottoastia.
2. Näytteenottopakkaus (Kuva 1), joka sisältää kuljetusputken, pipetin sekä näytteenottotikun (Alinity m multi-collect specimen collection kit).
3. Muovipussi ja nimitarra.



Kuva 1


Näytteenotto:

- Klamydia/tippurinäytettä varten sinun ei tarvitse tehdä alapesua, ellet samalla kertaa ota näytettä virtsan bakteeriviljelyä varten.
 - Jos otat samalla myös virtsaviiljelynäytteen, tee alapesu kuten virtsaviiljelynäytteenotossa neuvotaan ja laske kumpikin näyte eri astiaan. Alkuvirtsaa otetaan talteen klamydia- ja tippurinäytettä varten ja keskivirtsaa virtsaviiljelyä varten.
1. Ole virtsaamatta vähintään 60 min ennen näytteen ottamista.
 2. Virtsaa näyteastiaan noin 20–30 ml näytettä, mieluiten alkuvirtsaa (ensimmäisestä pisarasta lähtien).
 3. Avaa näytteenottopakkaus. Näytteenottoon tarvitset paketissa olevan kuljetusputken (Kuva 2 a) ja pipetin (Kuva 2 b). Pakkauksen sisältämää näytteenottotikkua et tarvitse. Sen voi hävittää.



Kuva 2 a, 2 b

4. Kierrä kuljetusputken korkki auki. Älä kosketele korkin sisäpintaa tai avoimen putken kaulaa. **Kuljetusputki sisältää nestettä, jota ei saa heittää pois.**
5. Siirrä virtsaa putkessa olevan nesteen päälle pakkauksen mukana tulevalla kertakäyttöpipetillä sen verran, että nesteen pinta kuljetusputkessa asettuu putken sivussa olevien **mustien viivojen väliin** (Kuva 3).



Kuva 3

6. Sulje putken korkki huolellisesti.
7. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeseen nimitarraan.**
8. **Kiinnitä nimitarra kuljetusputkeen (älä peitä kuvassa 3 näkyvää aluetta).**
9. Laita kuljetusputki muovipussiin.
10. Säilytä kuljetusputki huoneenlämmössä.
11. Tuo kuljetusputki laboratorioon viimeistään **seuraavana päivänä.**

Voit ottaa näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Laadittu 16.3.2023/MKL