

Lapsen virtsateiden ultraäänitutkimus

Jos virtsateiden ultraäänitutkimus tehdään virtsatieinfektion vuoksi, tulee tutkimus tehdä aikaisintaan 4 viikon kuluttua antibiootin loppumisesta.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

Alle 2-vuotiaat:

Alle kahden vuoden ikäistä lasta saat syöttää ja juottaa normaalisti ennen tutkimusta.

2-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset:

Lapsi saa syödä ja juoda normaalisti. Ultraäänitutkimukseen valmistautuessa on hyvä juoda runsaammin, mahdollisuuksien mukaan 1–2 tuntia ennen tutkimusta. Virtsarakon olisi hyvä olla mahdollisimman täynnä tutkimuksen aikana, ja siksi rakon tyhjentämistä on vältettävä ennen tutkimusta.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimukseen voit ottaa mukaan lapsen lempilelun. Lapselle on hyvä mainita, että tutkimushuoneessa on hämärää tutkimushetkellä. Ennen tutkimukseen tuloa voitte yhdessä kotona leikkiä tutkimustilannetta esimerkiksi nukun kanssa. Jos lapsi pelkää tutkimusta, on hänelle hyvä kertoa, ettei tutkimus satu lainkaan.

Tutkimuksessa laitetaan sopivaksi lämmitettyä geeliä lapsen iholle ja anturia liikutellaan tutkittavan elimen kohdalla. Tutkimuksen aikana röntgenlääkäri voi antaa lapselle hengitysohjeita, jotta tutkittava alue tulisi paremmin näkyviin.

Tutkimus kestää yleensä 10–30 minuuttia. Tutkimusaikamme eivät aina pidä paikkaansa, koska saatamme joutua tekemään kiireellisiä tutkimuksia ajanvarausten välissä.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Tutkimus ei edellytä jälkiseurantaa. Lapsi saa syödä ja juoda normaalisti.

Lähettävä poliklinikka, osasto tai terveysasema kertoo tutkimustuloksista sekä mahdollisista jatkotoimista.