

Sappi- ja haimateiden kuvaus eli ERCP

ERCP on tähytys- ja kuvantamistutkimus, jonka avulla voidaan todeta sappiteiden ja haiman sairauksia. Tutkimus tehdään taipuisalla tähystimellä suun kautta mahalaukkuun ja sieltä ohutsuolen alkuosaan. ERCP:n yhteydessä voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä röntgenlöpivalaisua ja varjoainetta käyttäen.

Ennen tutkimusta

- Ota etukäteen yhteyttä hoitavaan yksikköön jos käytät verta ohentavaa lääkettä (mm. Primaspan®, Marevan®, Xarelto®, Eliquis®, Omega-3®)
- Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta kello 24 lähtien.
- Ota lääkkeet normaalisti aamulla kello 6.00 pienen vesimäärän kanssa.
- Ilmoita henkilökunnalle mikäli sinulla on varjoaineyleherkkyys tai allergioita.
- Röntgenlöpivalaisun vuoksi mahdollinen raskaus on selvitettävä ennen tutkimusta.
- Sinulle laitetaan käsivarren suoneen kanyyli.

Tutkimuksessa

- Olet kylkiasennossa tutkimuspöydällä.
- Saat suihkutettavan puudutusaineen nieluun.
- Saat kanyylin kautta rauhoittavaa- ja kipulääkettä.
- Hengitystiet pysyvät avoimina koko tutkimuksen ajan.
- Tutkimus kestää noin 20–60 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen

- Lääkityksen vuoksi voit olla unelias tai tuntea nielun yhä puutuneeksi.
- Saat syödä ja juoda noin 2 tunnin kuluttua mikäli voitisi niin sallii.
- Olet sairaalassa seurannassa muutamia tunteja.
- Kova mahakipu ja lämpöily voivat olla merkkejä komplikaatioista. Ne ovat yleensä helposti hoidettavissa ilman lisätoimenpiteitä, mutta edellyttävät muutaman päivän sairaalassa.

Kotiutuminen ja jälkitarkastus

- Kotiutuminen tapahtuu tutkimuspäivän aikana tai seuraavana päivänä voinnin mukaan.
- Mikäli kotiudut samana päivänä, tulee sinulla olla hakija kello 15 mennessä.
- Mahdollinen jälkitarkastusaika annetaan kotiutumisen yhteydessä.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai alueesi päivystykseen jos ilmaantuu

- Voimakasta vatsakipua, joka ei helpotu kipulääkkeillä
- Verioksentelua
- Mustaa ulostetta
- Kuumetta yli 38 astetta