

## **AVBILDNING AV TJOCKTARMEN MED KONTRASTMEDEL ELLER KOLONGRAFI - FÖR BARN, 0-8 ÅRINGAR**

Vid undersökningen utreder man tjocktarmens funktion.

### **Hur förbereder du dig för undersökningen?**

För att undersökningen skall lyckas förutsätter det en lätt diet och eventuellt en tarmtömning.

#### **Barn under två år**

- **Dagen före undersökningen** kan barnet äta normalt.
- **På undersökningsmorgonen** får barnet varken äta eller dricka. Två timmar före undersökningen ges barnet ett Microlax® - lavemang.

#### **Barn 2 år och äldre**

##### **Dagen före undersökningen**

Diet:

- Under dagen får barnet få äta fiberfattig kost, helst bara vätskor och buljonger. Måltiden kan bestå av ca 100 g fisk eller höna med ris. Dessutom är buljong, saftsoppor, franskbröd eller annat ljust bröd också lämpliga.
- Lämpliga drycker är saft, vatten och läskedrycker utan kolsyra samt te eller kaffe utan mjölk.
- Man kan öka dagens energimängd genom att dricka preparat för näringstillskott som inte innehåller fiber. Sådana kan köpas på apoteket.
- Livsmedel som innehåller fiber är **förbjudna**. Safter och saftsoppor får inte innehålla frö eller fruktkött.
- Att tugga tuggummi är förbjudet.

**På undersökningsdagens morgon** får barnet varken äta eller dricka.

##### **Tarmtömning**

Tömningsmedicinen Laxoberon® påskyndar tarmfunktionen, medicinen via munnen både på morgonen och på eftermiddagen på dagen före undersökningen:

- 2 – 3 åringar 5 droppar blandad med vatten
- 4 – 10 åringar 10 droppar blandad med vatten
- över 10 åringar 15 droppar blandad med vatten

Tömningen börjar efter ca 2 – 6 timmar.

**På undersökningsdagens morgon** ca en timme före undersökningen ges Microlax® - lavemang till alla över 2 år.

### **Hur går undersökningen till?**

Vid undersökningen sätter man kontrastmedel i barnets tarm på samma sätt som man gett lavemang. Med hjälp av genomlysning avbildar röntgenläkaren hur kontrastmedlet passerar genom tarmen.

Vår avdelnings barnskötare är ofta med för att hjälpa till under undersökningen. Den ena föräldern får också gärna vara med, men en gravid mamma passar inte. Undersökningen tar ca 30-60 minuter.

### **Efter undersökningen?**

Efter undersökningen får barnet äta och dricka normalt. Kontrastmedlet avgår med avföringen. Den remitterande enheten informerar om resultaten av undersökningen.