

## Avföringsprov i torr burk

Du har fått laborieremiss för avföringsprov. Provet används för någon av dessa undersökningar:

- VirVi (2975)
- F-Elast1 (1718)
- F-VirNhO (14157)
- F-ParaNhO (13844)
- SienVi, uloste (2631)

Varje undersökning kräver separat avföringsprov.

### Förnödenheter

1. Behållare av plast eller papp
2. Burk för avföring (Figur 1)
3. Plastpåse och namndekal

### Provtagning

1. Låt avföring komma i plast- eller pappbehållaren eller på toalettpapper.
2. Öppna provburken för avföring och använd stickan som är fäst i burklocket för att ta ungefär en tesked avföring i burken (burken får inte bli full).
3. Om avföringen är lös (diarréavföring), lägg en matsked avföring i burken.
4. Tillslut burken ordentligt.
5. Var försiktig så att avföring inte kommer på utsidan av burken.
6. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslog på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboriet.**
7. **Fäst dekalen vid burken med provet.**
8. Lägg burken med provet i plastpåsen
9. Förvara burken med avföringsprovet svalt, helst vid kylskåpstemperatur.



Figur 1

Returnera transportröret med provet till laboratoriet senast dagen efter provtagningen.

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Granskad 17.7.2023 XX/PL