
Gynekologisk laserbehandling

Genom en behandling med laser avlägsnas förstadier av cellförändringsområden i de yttre könsorganen.

Man försöker undvika vård under menssen. Du skall vara i kontakt ifall du har riklig blodig flytning. Du kan fråga råd om hur man kan flytta menssen från din vårdenhet.

Laserbehandling

Du kan ta smärtmedicin en timme innan du kommer till behandlingen.

Behandlingen görs polikliniskt i undersökningsrummet och kräver ingen uppföljning på sjukhuset eller sjukledighet.

Vid laserbehandlingen avdunstar laserstrålen bort förändringsområdet. Behandlingen görs på poliklinikbesöket vid en [Kolposkopiundersökning](#) och kräver ingen sjukledighet. Besökstiden tar 45–60 minuter.

Efter behandling hemma

Efter åtgärden kan du ta receptfria smärtstillande mediciner för eventuell smärta. På grund av **ökad infektions- och blödningsrisk** skall man undvika simning, karbad, användning av tamponger och menskopp samt samlag ända tills den eventuella efterblödningen har slutat.

Om provsvar och eventuell fortsatt vård kommer man överens individuellt.

Eventuella problem och kontakt uppgifter

Ta kontakt med din vårdenhet om efterblödningen blir rikligare eller illaluktande, du får feber eller smärta i underlivet. Symtomen kan vara ett tecken på en infektion.