

Helicobacter i avföringen (F-HepyAg, 3952)

Förnödenheter

- Behållare av plast eller papp
- Burk för avföringsprov (Bild 1). Finns att få på laboratoriet.
- Plastpåse och namndekal



Figur 1.

Provtagning

- Låt avföring komma i plast- eller pappbehållaren eller på toalettpapper.
- Öppna provburken för avföring och använd stickan som är fäst i burklocket för att ta ungefär en tesked avföring i burken (burken får inte bli full).
- Tillslut burken ordentligt.
- Var försiktig så att avföringsprov inte kommer på utsidan av burken.
- Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslag på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.
- Fäst dekalen vid burken med provet.
- Lägg burken med provet i plastpåsen
- För provburken till laboratoriet ännu under samma dag som du tog provet. Obs! Prov kan förvaras i kyl tre dygn efter provtagning. Prov kan transporteras i rumstemperatur. Vid längre tids förvaring ska provet frysas och skickas fryst.

Begränsningar för provtagningen

- Om du tar provet för att kontrollera om eradikeringen av magsårsbakterien *Helicobacter* efter antibiotikakur har lyckats, får provet tas tidigast 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.
- Undersökningen kan inte göras på diarréavföring.

Du får inte använda följande mediciner i två veckors tid före undersökningen:

1. Antibiotika
2. Protonpumpshämmare
 - a. lansoprazol (Gasterix, Lansoprazol, Zolt)
 - b. omeprazol (Losec, Omeprazol, Omestad, Omep)
 - c. pantoprazol (Pantoprazol, Pantoprazole, Somac)
 - d. rabeprazol (Pariet, Rabeprazol)
 - e. esomeprazol (Acidal, Esomeprazol, Esomeprazole, Nexium)

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Granskad 2.2.2023/JH.