

## **Kontrastundersökning av sväljningsfunktionen för barn**

Med kontrastundersökningen utreder man matstrupens struktur och funktion. En gravid person kan inte vara med vid undersökningen. Kontrastundersökning av sväljningsfunktionen för barn görs i samarbete med en talterapeut.

### **Hur förbereder du dig till undersökningen?**

Före undersökningen bör man vara oäten fyra timmar före och utan att dricka cirka två timmar innan. På det här viset är barnet mer mottagligt för att dricka kontrastmedlet. Vatten kan man dricka som vanligt. Om barnet har en näs-mag-slang, bör den tas bort fem dygn före undersökningen. Man kan ta med en mugg/napplaska och sked som man vet att barnet tycker om.

### **Hur går undersökningen till?**

Undersökningen görs antingen stående eller sittandes i undersökningsställningen. Undersökningen inleds med flytande kontrastmedel, samtidigt tas röntgenbilder av svalget och matstrupen. Alternativt kan kontrastmedlet även ges som inblandad i fast föda. Därför är det önskvärt att ta med sig sådan fast föda som barnet tycker om. Exempelvis fruktpuré, pudding och bröd med mera. Undersökningen tar cirka 30 minuter.

### **Efter undersökningen?**

Barnet får äta och dricka normalt. Vi rekommenderar att barnet får något mellanmål efter undersökningen. Den remitterande läkaren informerar om resultaten av undersökningen.