

## **MK Magnetundersökning av prostatan**

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

### **Hur förbereder du dig för undersökningen?**

#### **Dagen före undersökningen**

- Ät inte kost som orsakar gasbesvär (bland annat kål, ärter, bönor).
- Ta på dagen före undersökningdagen två TOILAX 5 mg enterotabletter på morgonen och två TOILAX 5 mg enterotabletter på kvällen

#### **På undersökningdagen**

- Du får varken äta eller dricka 3 timmar före undersökningen. Mediciner som ordinerats av läkare får du ta med en liten mängd vatten.
- Använd TOILAX lavemang 2-4 timmar före undersökningen. TOILAX enterotabletter och lavemang kan köpas utan recept på apoteket. Om du har frågor gällande användning av lavemang ta kontakt med den vårdande enheten.
- Smycken och piercings måste tas bort och det är bäst att lämna dem hemma.

### **Hur går undersökningen till?**

Avbildningen utförs i en upplyst och luftkonditionerad magnetavbildningsapparat som är öppen i båda ändorna. Under undersökningen har man signal- och talkontakt med skötaren. För att undersökningen ska lyckas, bör man hållas stilla. Kroppsställningen under undersökningen försöks få så bekväm som möjligt.

Avbildningsapparaten har ganska hårt ljud och därför har du hörlurar eller öronproppar under undersökningen. Under de flesta undersökningarna är det möjligt att lyssna på musik. Du kan även ta med en egen CD-skiva.

Under undersökningen ger man eventuellt intravenöst tarmrelaxande läkemedel och kontrastmedel som inte innehåller jod. I sådana fall sätts en kanyl före undersökningen. Kontrastmedlet avlägsnas från kroppen med urinen.

### **Efter undersökningen?**

Undersökningen förutsätter ingen uppföljning på sjukhuset. Den remitterande enheten informerar om undersökningens resultat.

### **Annat att observera**

Undersökningen tar ca 30-45 minuter. På magnetavdelningen avbildas också jourpatienter, vilket kan medföra ändringar i tidtabellen. Reservera gott om tid för undersökningen.

Undersökningen har inga kända biverkningar. Vissa saker kräver emellertid iakttagelse när man planerar avbildningen. Informera undersökningsenheten om du har pacemaker, protes i innerörat, läkemedelspump, operationsclips, metallsplitter eller metallfragment i kroppen.

Glukosmätarens sensor måste avlägsnas före avbildningen. Meddela skötaren om du använder läkemedelsplåster.

Fyll i förhandsuppgifterna och ta med blanketten till undersökningen.

# Förhandsuppgifter för magnetundersökning

Namn: \_\_\_\_\_ Personbeteckning: \_\_\_\_\_

Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_

**Ja**                      **Nej**

**Har du blivit opererad?**

\_\_\_\_\_

Om du svarade ja, vilka operationer?

\_\_\_\_\_

**Har du något/några av följande i er kropp?**

**Ja**                      **Nej**

Pacemaker eller -kablar

\_\_\_\_\_

Hjärtklaffprotes

\_\_\_\_\_

Nervstimulator eller -kablar

\_\_\_\_\_

Öronproteser eller implantat i inner- eller mellanörat

\_\_\_\_\_

Hörapparat

\_\_\_\_\_

Shunt

\_\_\_\_\_

Stentar/coilar/aneurysmaclips

\_\_\_\_\_

Metallflisor i kroppen

\_\_\_\_\_

Infusionsport och/eller läkemedelspump

\_\_\_\_\_

Ledprotes/fixationsskruvar

\_\_\_\_\_

Tandprotes

\_\_\_\_\_

Tatueringar/piercings

\_\_\_\_\_

Har du allergi mot kontrast- eller bedövningsmedel?

\_\_\_\_\_

Har du njursvikt?

\_\_\_\_\_

Har du blivit steriliserad?

\_\_\_\_\_