

Muskelprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi

Syftet med ingreppet

Muskelprovbitar (muskelbiopsi) används för undersökning av vilka förändringar olika sjukdomar förorsakar i muskelvävnaden.

Förberedelser

- Ifall du har blodförtunnande medicin i bruk (Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana), berätta det innan undersökningen. **Om du använder läkemedlet Marevan, var god kontrollera vilket ditt senaste INR-värde har varit** så att du kan berätta värdet innan undersökningen påbörjas. Berätta också om du har konstaterat ökad blödningsrisk.
- Före ingreppet kan du använda mediciner och äta normalt.
- Anmäl före ingreppet börjar om du har några läkemedels- eller bedövningsmedelsallergier.

Ingreppets förlopp

Innan muskelprovbitar tas, utförs en EMG-undersökning (separat patientanvisning) och på basis av EMG-resultatet avgör läkaren från vilken muskel provbiten ska tas. Oftast tas provbitar från låret, musklerna kring skenbenet eller överarmen. Under ingreppet ligger du på rygg på sängen.

Läkaren bedövar stället där provbiten ska tas och gör ett c. 1 cm långt hudsnitt som används för att ta 3–4 små muskelprovbitar. Snittet sys fast med 1–3 stygn och ett sårplåster anläggs. Tidsreserveringen för ingreppet är 40 minuter.

Efter ingreppet

Håll såret torrt under en vecka efter ingreppet. Du kan låta stygnen tas bort efter 1 vecka. Vanligen avlägsnas stygnen vid hälsocentralen. **Reservera tid för stygnborttagning i god tid före.** Du får en skild sårvårdsanvisning innan du åker hem från avdelningen.

En läkare vid patologiavdelningen utfärdar ett utlåtande om muskelprovbiten. Utlåtandet skickas till avdelningen eller polikliniken som remitterade dig för undersökningen och den enheten berättar åt dig om undersökningsresultaten och om eventuella fortsatta åtgärder.