

Pregnyl® förberedelse och injicering av medicinen

Informationen är ämnad till en patient som genomgår fertilitetsbehandlingar där det ingår användning av läkemedlet Pregnyl®.

Inskaffa från apoteket följande:

- Pregnyl® 5000 IU läkemedelsförpackning (receptbelagd). Förpackning innehåller med medicin (pulver) och lösningsmedel.
- 2 milliliters spruta.
- En liten nål för injicering av medicinen (till exempel orange 25 G 16 mm).
- En större nål för blandning av medicinen (till exempel gul 19 G 40 mm).

Förvara Pregnyl® läkemedlet alltid i kylskåp och ta den fram i **rumstemperatur 15 min** innan injicering.

Att förbereda medicinen:

1. Tvätta händerna.
2. Ta fram alla saker som du behöver.
3. Lösgör försiktigt plastlocket från båda glasflaskor genom att försiktigt vända på kanten.
4. Ta den större nålen (gul 19 G 40 mm) ur förpackningen och fastsätt den i sprutan. Ta bort nålskyddet.
5. Stick in nålen lodrätt igenom mitten av gummikorken på **LÖSNINGSMEDLET**.



6. Vänd flaskan, med nålen ännu fast, upp och ner. Nålens topp får bli väl under vätskeytan. Dra all vätska in i sprutan genom ett drag i kolven. Dra ut sprutan med väskan ur injektionsflaskan.



7. Stick samma nål in i **LÄKEMEDELSFLASKAN** (Pregnyl® 5000 IU) genom gummilocket. Spruta in all vätska i flaskan genom att trycka in kolven helt och hållet. Läkemedlet blandas snabbt med lösningsmedlet. Kontrollera ännu genom att hålla flaskan **att vätskan är klar**. Du skall **inte skaka på flaskan eller röra den runt!**



8. Dra **all medel in tillbaka i sprutan**. Dra ut sprutan ur injektionsflaskan.
9. Ta bort nålen. Avlägsna nålen från sprutan och sätt den i en behållare för stickande och skärande avfall.
10. Byt till den mindre nålen (orange 25 G 16 mm) i sprutan och ta bort nålskyddet.
11. **Avlägsna all överlopps luft från sprutan** på följande sätt: Håll sprutan i handen så, att nålen är uppåt. Knäpp lätt med fingret mot sprutan så, att all vätska faller ner i sprutan. Tryck kolven försiktigt uppåt så, att **vätskans yta är fast i sprutans övre del** och det **kommer en liten droppe vätska ur nålen**. Små luftbubblor i sprutan stör inte.



Injisering av medicinen:

1. Lyft ett stort hudveck i magen mellan tummen och pekfingeret.
2. Stick nålen helt och hållet rakt in i hudvecket.
3. Kläm lugnt in kolven helt och hållet tills hela läkemedelsmängden är insprutad.
4. Håll nålen ännu kvar en stund och räkna sakta till tio.
5. Dra nålen ut långsamt.
6. Bli av med verktygen enligt anvisningarna.

