

Provtagning för bakterier som är resistenta mot antibiotika

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Patienter som kommer till sjukhus eller vårdenhet inom Egentliga Finlands vårdförskådområde genomgår screening för igenkänning av bakteriebärare. Målet är att förebygga spridningen av resistenta (= motståndskraftiga mot antibiotika) bakterier i sjukhusen och vårdenheterna.

		Nödvändiga screeningprover		
Kryssa i rätt alternativ	Du kan ha utsatts för resistenta bakterier pga. någon av orsakerna nedan (den som fyller i blanketten väljer själv rätt alternativ).	MRSA-SeVi (12584)	VRE (1788)	ResGNS (11815)
	1. Exponering, för att du har vårdats (>24 timmar) på sjukhus / vårdanstalt utomlands under det senaste året.	x	x	x
	2. Exponering, för att du har bott på barnhem utomlands/ på flyktingläger /flyktingförläggning eller varit asylsökande under det senaste året.	x	x	x
	3. Exponering för att du har bott eller jobbat på svingård under det senaste året eller för att en annan riskfaktor för MRSA-bakterier har identifierats.	x		
	4. Exponering för att du bor i samma hushåll som bärare av en multiresistent mikroob. <i>Den som fyller i blanketten kryssar för den mikroben som ska screenas.</i>			
	5. Exponering för att du under en tidigare vårdperiod inom Egentliga Finlands vårdförskådområde vårdats samtidigt som en patient med positivt svar (provtagningens nödvändighet och mikroben som ska screenas är antecknad i den elektroniska patientjournalen). <i>Den som fyller i blanketten</i>			

	<i>kryssar för den mikrob som ska screenas.</i>			
--	---	--	--	--

Den som fyller i blanketten väljer alternativ:

- ☐ Vi ber att du kontaktar den egna hälsovårdscentralen för provtagning. Ta med den här blanketten till hälsovårdscentralen.
- ☐ Du får remiss för distansprovtagning till laboratoriet för provtagning

Proverna tas med bomullspinne, oftast från näsan, svalget, armhålor, ljumskarna och ändtarmsmynningen samt från möjliga utslag och sår. Vilken bakterie som screenas inverkar på valet av provtagningsställen. **Proverna tas på två separata dagar.** Provtagningen är en skyddsåtgärd och ger inte upphov till oro. Provtagningen kräver ingen särskild förberedelse. Det tar cirka en vecka för resultaten att bli klara. Efter negativa provsvar behövs inga andra åtgärder. Om provet är positivt tar man kontakt antingen från sjukhuset eller från den egna hälsovårdscentralen.

Datum ____ / ____ / ____

Enhet _____

Den som fyllt i blanketten _____ Kontaktuppgifter: _____