

Pulserad fältablation av nerven

Allmänt om undersökningen?

Vi har bokat dig en tid för pulsfältsablation. Under åtgärden behandlas den irriterade nerven med pulserad radiofrekvensenergi. Åtgärden genomförs antingen ultraljuds- eller datortomografistyrtd varvid vi eventuellt använder röntgenstrålar.

Hur förbereder du dig inför åtgärden?

- Blodförtunnande medicinering pausas enligt särskilda instruktioner som ni får från den remitterande polikliniken eller avdelningen. Patienter med hjärtklaffprotes eller annan absolut anledning gör inte uppehåll i sin blodförtunnande medicinering. Kontakta polikliniken även om du är överkänslig för antingen bedövnings- eller kontrastmedel eller du misstänker att du är gravid.
- På åtgärdsdagen ska du vara utan att äta och dricka 4 timmar före åtgärden. Du får inte dina läkemedel som vanligt.
- Beroende av åtgärdsobjektet kan du få en plats på vårdavdelningen eller bli direkt kallad till åtgärdsavdelningen.

Hur genomförs åtgärden?

Under åtgärden ligger du antingen på buk eller på rygg så stilla som möjligt. Din ställning görs så stadig och bekväm som möjlig med hjälpmedel.

Efter att huden tvättats och bedövts för åtgärdsläkaren en tunn nål in på området av den irriterade nerven. Nålens position följs upp med vissa mellanrum antingen med ultraljud eller datortomografi, och rätt ställe säkerställs genom att stimulera nerven före själva behandlingen.

Vad sker efter åtgärden?

- Nervrotsanestesi tar cirka 1–2 timmar.
- Efter åtgärden får du äta och dricka som vanligt, förutsatt att du inte har några andra begränsningar.
- Beroende av åtgärden är en sömning på 1-2 timmar möjlig.
- Om det uppstår besvär efter åtgärden, kontakta den inremitterande enheten eller ÅUCS akuten.

Varifrån får du höra information om åtgärdsresultaten?

Den fortsatta uppföljningen sker antingen på den inremitterande polikliniken eller avdelningen.