

## Ultraljudstyrd dränering av en vätskesamling

### Vad är syftet med ingreppet?

Ni kommer till en ultraljudstyrd placering av dränageslang. Eftersom ingreppet kräver både förberedelser och eftervård har ni reserverats en plats på bäddavdelningen.

### Hur förbereder Ni Er för ingreppet?

- Ni kommer till sjukhuset på morgonen dagen för ingreppet enligt avdelningsinstruktionerna.
- **På dagen för ingreppet ska ni vara fastande.**
- Före ingreppet tas blodprov.
- Innan ingreppet bör ni ta en paus från att ta vissa läkemedel t.ex. **Marevan**. Avdelningen ger mer detaljerade instruktioner om hur man pausar medicinerna.
- Intaget av **Omega-3**- preparat bör avbrytas en vecka före provtagningen om möjligt.
- Ni kan ta andra läkemedel som tidigare med en liten mängd vatten.

### Hur utförs ingreppet?

- Ingreppet görs under lokalbedövning med hjälp av ultraljud. Ingreppet är vanligtvis tämligen smärtfritt men ni har dock möjligheten att få smärtstillande medel.
- Åtgärdsområdet rengörs och bedövas före ingreppet.
- Dränageslangen är en mjuk plastslang vars ena ända placeras in i vätskeansamlingen och den andra ändan fästs på huden. Till slangen ansluts en dränagepåse i vilken vätskan töms. Dränageslangen fästs på huden och ska lämnas på plats om vården så kräver. Den vårdande avdelningen tar hand om dess borttagning.
- Åtgärden tar ungefär 30 – 60 minuter.

### Efter ingreppet?

- Efter ingreppet kontrolleras ert blodtryck och er puls på avdelningen och ni får smärtstillande medel vid behov.
- Efter ingreppet får ni äta och dricka normalt såvida det inte finns några andra begränsningar

### Hur hör ni om resultaten?

Den remitterande avdelningen informerar er om resultaten samt om eventuella vidare åtgärder.