

## Ultraljudstyrd provbitstagning (biopsi) från levern

Ni kommer till en ultraljudstyrd provbitstagning. Eftersom ingreppet kräver både förberedelser och eftervård har ni reserverats en plats på bäddavdelningen.

### Vad är syftet med ingreppet?

Provtagningen görs för att bestämma kvaliteten och svårighetsgraden av ett potentiellt hälsoproblem.

### Hur förbereder Ni Er för ingreppet?

- Ni kommer till sjukhuset på morgonen dagen för ingreppet enligt avdelningsinstruktionerna.
- **På dagen för ingreppet ska ni vara fastande.**
- Före ingreppet tas blodprov.
- Innan ingreppet bör ni ta en paus från att ta vissa läkemedel t.ex. **Marevan**. Avdelningen ger mer detaljerade instruktioner om hur man pausar medicinerna.
- Intaget av **Omega-3**-preparat bör avbrytas en vecka före provtagningen om möjligt.
- Ni kan ta andra läkemedel som tidigare med en liten mängd vatten.

### Hur utförs ingreppet?

Radiologen gör ingreppet under lokalbedövning med hjälp av ultraljud. Före ingreppet inspekteras provtagningsstället med ultraljud och huden rengörs och täcks därefter. Med ultraljudsanordningen säkerställs den rätta placeringen av provnålen. Det tas vanligtvis 1-3 provbitar. Åtgärden tar ungefär 30 – 60 minuter. Vid behov har ni möjlighet att få smärtstillande medel.

### Efter ingreppet?

- Under och efter provtagningen kan ni uppleva smärta i axelområdet.
- Efter provtagningen är ni i sängläge i 4-6 timmar för att minska blödningsrisken. Ifall ni inte orkar ligga på rygg flyttar skötaren er till en annan ställning. Det är förbjudet att höja huvudet och benen.
- Under sängvilan på bäddavdelningen kontrolleras ert blodtryck och er puls.
- Efter ingreppet får ni äta och dricka normalt såvida det inte finns några andra begränsningar.

- Ni skrivs ut från sjukhuset på undersökningsdagen. Tung belastning, bastu och varma bad bör undvikas de följande dagarna. Vid utskrivningen får ni mer detaljerade efterbehandlingsinstruktioner från avdelningen.
- Under några dagar kan ni känna lätt smärta vid injektionsstället och i axelområdet. Om smärtan blir värre, kontakta den remitterande enheten eller ÅUCS samjour.

## **Hur hör ni om resultaten?**

Den remitterande polikliniken eller avdelningen informerar er om resultaten.