
Ultraljudsundersökning av och provbitstagning från prostata

Prostatan undersöks med ultraljudsundersökning och provbitstagning.

Undersökning

Ultraljudsundersökningen genomförs via ändtarmsmynningen med hjälp av en ultraljudssond. Undersökningen tar ca 15 minuter. I samband med ultraljudsundersökningen kan man vid behov ta provbitar från prostatan. Före provbitstagningen bedövas prostatan. Det hänför sig en liten infektionsrisk till provtagningen, på grund av vilket man ger dig antibiotika före och efter undersökningen.

Eventuella symtom efter provbitstagningen

- Efter provbitstagningen kan urinen vara blodblandad en tid, på grund av vilket det är bra att dricka vätskor mer än normalt (1,5 - 2 liter/dygn) i några dagar.
- Det kan förekomma blod i avföringen och sädesvätskan eller så kan sädesvätskan vara brunaktig i några veckor.
- Mot smärta kan du vid behov ta receptfria smärtstillande läkemedel, sådana som ibuprofen eller paracetamol.

Fortsatt vård

Den fortsatta vården planeras enligt svaret på provbitarna. Du får information om svaren på provbitarna och om planen för fortsatt vård per telefon eller per brev. Vid behov får du en kallelse till vårdförhandlingar.

Ifall det uppstår följande symtom, ska du ta kontakt med den vårdande enheten eller med akuten

- blödningen är riklig
- urineringen lyckas inte
- det förekommer kontinuerlig smärta i nedre buken
- du får plötsligt hög feber

