

Argon hoidon jälkeen

Sinulta on tähystyksen yhteydessä ____ / ____ 20 ____ hoidettu suolen / mahalaukun limakalvomutosta argonkaasua ja sähkövirtaa käyttäen.

Toimenpiteen jälkeen

Jos toimenpide on tehty ruokatorven kautta ole syömättä ja juomatta kaksi tuntia klo ____ saakka.

- syö haaleita liemiruokia toimenpidepäivänä
- toimenpidettä seuraavana päivänä voit ruokailla normaalisti

Jos toimenpide on tehty peräsuolen kautta, voit syödä ja juoda normaalisti.

Vältä raskasta ponnistelua ja nostelua viikon ajan.

Jos sinulle on annettu Argon-hoitoa peräsuoleen, niin verenvuotoa saattaa ilmetä jopa yli viikon toimenpiteen jälkeen.

Mikäli sinulle ilmaantuu 3 vuorokauden sisällä toimenpiteestä

- runsas verenvuoto (verioksentelu, veriripuli)
- mustat ulosteet
- kova kipu vatsan alueella
- kova, äkillisesti alkanut huimaus

Ota yhteys sinua hoitaneeseen yksikköön tai päivystyspoliklinikalle. Yhteystiedot alla.

Yhteystiedot

Tähystysyksikkö
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 02 627 7961