

BCG-rakkohuuhtelu

BCG (Bacillus Calmette Guerin) on tehokkain käytössä oleva lääke pinnallisen virtsarakkosityövän hoitoon. Hoidon vaikutus perustuu paikallisen immuunipuolustuksen aktivoimiseen. Hoitoa ei voi antaa oireisen virtsatulehduksen aikana, eikä silloin jos virtsan mukana on näkyvää verta.

Hoito toteutetaan seuraavasti:

- alkujakso on kuusi lääkeannosta viikon välein
- virtsarakontähystys noin kolmen kuukauden välein
- jatkossa lääkehoito kolmen viikon jaksoissa (ylläpitohoito)
- hoidon kokonaiskesto on 1-3 vuotta

Ennen toimenpidettä

Virtsanäyte tarkastetaan ennen ensimmäistä huuhtelukäyntiä ja jatkossa tarpeen mukaan. Tästä sovitaan hoitajan kanssa aina huuhtelukäynneillä.

Hoitopäivän aamuna tulisi juoda mahdollisimman vähän, jotta lääke on helpompi pidättää virtsarakossa noin kahden tunnin ajan. Aamupalan saa syödä ja aamulääkkeet ottaa normaalisti. Jos käytät nesteenoistolääkkeitä, ne kannattaa ottaa vasta hoidon jälkeen.

Hoidon toteuttaminen

Virtsarakko tyhjennetään katetrilla ja lääke ruiskutetaan virtsarakkoon. Toimenpide kestää muutaman minuutin ja lääkkeen laitton jälkeen katetri poistetaan. Lääkettä pidetään rakossa kaksi tuntia, ei pidempään. Sinä aikana on hyvä olla liikkeellä ja vaihtaa asentoa. Näin varmistetaan lääkkeen leviäminen joka puolelle rakon seinämää.

Toimenpiteen jälkeen

Voit kotiutua heti toimenpiteen jälkeen ja lääkeaine virtsataan pois rakosta kotona. Kahden vuorokauden ajan on pestävä alapesu juoksevilla vedellä jokaisen virtsaamiskerran jälkeen. Huolellinen käsienpesu on myös tärkeää WC:ssä käynnin jälkeen, jottei lääkeainetta jää iholle. BCG-hoito aiheuttaa usein tihentynyttä virtsaamistarvetta ja kirvelyä virtsatessa. Hoitopäivän ajan on hyvä juoda tavallista runsaammin, jotta oireet helpottavat ja virtsatiet huuhtoutuvat. Flunssan kaltaista oireilua, kuten kuumetta ja vilunväristyksiä voi esiintyä hoidon jälkeisinä päivinä. Tarvittaessa oireisiin voi ottaa kipulääkettä. Partnerin suojaamiseksi suositellaan kondomin käyttöä tai sukupuoliyhteydestä pidättäytymistä viikon ajan hoidon jälkeen.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteyttä päivystykseen tai hoitavaan yksikköön, jos sinulle nousee korkea, horkkamainen kuume tai kuume kestää yli kaksi vuorokautta.

Ota yhteyttä myös, jos yleisvointi heikkenee. Oireet voivat olla lääkkeen sivuvaikutuksia tai merkkejä tulehduksesta.

Yhteystiedot

Porin toimipiste

Kirurgian poliklinikka, urologinen hoitaja

puhelin 044 707 9776

maanantaista-perjantaihin kello 8-14

Rauman toimipiste

Kirurgian poliklinikka

puhelin 02 627 8698

maanantaista-perjantaihin kello 9-12