

Belimumabi, BENLYSTA® – reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Belimumabia käytetään SLE:n hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Belimumabi kuuluu ns. biologisten lääkkeiden ryhmään. Belimumabi on vasta-aine, joka sitoutuu liukoiseen B-soluja stimuloivaan proteiiniin (Blys) estäen B-solujen stimulaatiota. Lääke vaimentaa immunologista tulehdusprosessia ja sidekudostautiin liittyviä oireita.

Annostus ja antotapa

Belimumabia annostellaan laskimonsisäisenä tiputuksena sairaalassa. Suositeltu annos on 10 mg/kg päivinä 0,14 ja 28 ja tämän jälkeen neljän viikon välein. Infuusio kestää yleensä tunnin, jonka aikana hoitaja seuraa vointia. Hoidon antamisen jälkeen potilasta seurataan sairaalassa puolisen tuntia. Ennen tiputuksen aloittamista potilaalle voidaan antaa esilääkitys (parasetamoli ja antihistamiini) lääkereaktioiden ehkäisemiseksi.

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja/tai verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja menevät nopeasti ohi. Belimumabi-infusioiden välillä voi esiintyä nokkosrokkoa, päänsärkyä, hengenahdistusta, huimausta ym, mutta nämä haitat ovat hyvin harvinaisia. Belimumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektio tauti tai vakava krooninen infektiosairaus.

Raskaus ja imetys

Belimumabia ei yleensä käytetä raskauden tai imetyksen aikana. Lääke suositellaan tauotettavaksi 4 kk ennen raskautta.

Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan aluksi ennen infuusiota ja jatkossa **3 kuukauden välein**. Turvakokeet ovat seuraavat: **PVK, B-NEUT ja ALAT. KREA, U-Kemseu, CRP, La** tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

Muuta huomioitavaa

Belimumabi tauotetaan vähintään yksi viikko ennen ja jälkeen leikkauksen. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos otettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen luonne ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektioriski ja perussairauden uusiutumisen riski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotusten ajan tasalla.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet](#) | [Reumatalo.fi](#) | [Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612