

Biologisiin hoitoihin liittyvä infektioriski

Sinulle on aloitettu biologinen hoito vaikean ihotaudin hoidoksi. Biologisiin hoitoihin liittyy lisääntynyt riski bakteeri- ja virusinfektioihin. Riski liittyy:

- Lieviin infektioihin (esim. tavallinen flunssa)
- Vakaviin infektioihin (esim. keuhkokuume, verenmyrkytys, munuaisaltaan tulehdus).

Vakavien infektioiden riskin arvioidaan olevan noin kaksinkertainen verrattuna potilaisiin, joilla ei ole biologista hoitoa. Riski on suurin biologisen hoidon ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.

Tämän johdosta sinun tulee hakeutua tavallista herkemmin lääkärin vastaanotolle, mikäli havaitset infektio-oireita. Kaikki infektiot tulee myös hoitaa mahdollisimman tehokkaasti, tarvittaessa antibioottikuurilla. Biologisten hoitojen aikana kuume ei välttämättä nouse normaalisti, joten kuumeetonkin infektio voi olla merkittävä.

Vakavien infektioiden riskin vähentämiseksi suositellaan pneumokokkrokotetta yli 65-vuotiaille ja henkilöille, joiden infektioriski on muutoin suurentunut. Lisäksi suositellaan ottamaan vuosittain influenssarokotus.

Mikäli sinulla on vaikea infektio, tai sellainen infektio johon sinulle on määrätty antibioottikuuri, tulee biologinen hoito (ja mahdollisesti käytössä oleva metotreksaattihoito) keskeyttää, kunnes olet täysin terve. Tämän jälkeen hoitoa voidaan jatkaa normaalisti.