

Bosentaani, TRACLEER® – reumasairauksien hoidossa

Vaikutustapa/käyttöaihe

Bosentaani on endoteliinireseptorin vastavaikuttaja. Endoteliini on valkuaisaine, jota erittyy verisuonten sisäpintaa peittävästä soluista ja se on yksi voimakkaimmista verisuonia supistavista aineista. Bosentaanin vaikutuksesta verisuonivastus pienenee. Bosentaania käytetään sekä kohonneen keuhkovaltimopaineen että vaikeiden sormihaavaumien hoitoon ja uusiutumisen estoon sklerodermaa tai muita systeemisiä sidekudostauteja sairastavilla potilailla.

Annostus ja ottotapa

Aloituseros on 62.5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa ja neljän viikon kuluttua annos nostetaan yleensä annokseen 125 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Ruoka ei vaikuta imeytymiseen. Tablettien ottamisen yhteydessä tulee juoda lasillinen vettä.

Haittavaikutukset

Tavallisin lääkkeeseen liittyvä haittavaikutus on päänsärky. Sen lisäksi se saattaa aiheuttaa kasvojen punoitusta, kurkun- ja nenäkäytävien ärsytystä, säärien ja nilkkojen turvotusta, verenpaineen laskua, sydämen tykytystä, närästystä, väsymystä, kutinaa, pahoinvointia, anemiaa. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat oksentelu, ripuli, vatsakipu, ihottuma ja verihiutaleiden määrän lasku. Joskus voi ilmaantua silmien tai ihon keltaisuutta tai kuumeilua, johon liittyy pahoinvointia tai oksentelua. Tuolloin on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, sillä se saattaa liittyä maksan toiminnanhäiriöön.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana lääkettä ei saa käyttää. Lääke on lopettava vähintään 3 kk ennen suunniteltua raskautta.

Seuranta

Turvakokeet tutkitaan **kuukauden kuluttua** aloituksesta ja jatkossa hoitavan lääkärin harkinnan mukaan. Lisäksi annosnoston yhteydessä on otettava ylimääräiset maksakokeet 2 vk kuluttua annoksen nostosta. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat: **PVK, B-NEUT ja ALAT**.

Muuta huomattavaa

Lääkkeellä saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Leikkausten yhteydessä lääkitystä ei tarvitse tauottaa.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet](#) | [Reumatalo.fi](#) | [Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka

Soittoaika klo 09-12

p.02 627 8612