

Botox-hoito virtsarakkoon

Botox lääkeaineen tarkoituksena on rentouttaa virtsarakkolihasta. Tämä lisää virtsarakon vetoisuutta, vähentää virtsaamistarpeen tunnetta ja virtsan karkailua.

Valmistautuminen

Käy antamassa virtsanäyte kaksi viikkoa ennen toimenpidettä.

Toimenpidepäivänä voit syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeesi normaalisti.

Tee huolellinen alapesu kotona ennen toimenpidettä.

Valmistelut poliklinikalla

Tulehdusriskin vähentämiseksi saat tuntia ennen toimenpidettä antibiootin sekä kipulääkkeen.

Toimenpiteen suorittaminen

Virtsarakkoon viedään täyhystin, jonka kautta Botox-lääkeaine ruiskutetaan useampaan kohtaan virtsarakon seinämään. Voit kotiutua heti toimenpiteen jälkeen.

Toimenpiteen jälkeen

Hoidon teho tulee esille noin kahden viikon kuluessa ja vaikutus kestää noin 2-9 kuukautta.

Hoito voi aiheuttaa virtsaamisvaikeutta ja tarvittaessa sinulle opetetaan toistokatetrointi eli virtsarakon tyhjentäminen katetrilla. Jos et saa virtsattua hakeudu päivystyspoliklinikalle.

Muutaman päivän ajan voi tuntua kipua virtsatessa ja virtsassa saattaa olla verta. Juo ensimmäisen vuorokauden aikana normaalia enemmän. Kipuun voit tarvittaessa ottaa kipulääkettä.

Lääkäri määrää yksilöllisesti jatkohoidon ja mahdollisen jälkikontrollin.

Yhteystiedot

Porin toimipiste

Kirurgian poliklinikka, uroterapeutti
puhelin 044 707 3807
tiistai - perjantai kello 8.00 – 14.00

Rauman toimipiste

Kirurgian poliklinikka, uroterapeutti
puhelin 050 473 5916
maanantaisin ja torstaisin kello 8.00 – 9.00