

## Clostridium difficile (F-CldTNhO 6141)

---

### Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella etsitään antibioottiripulin tai sairaalassa alkaneen ripulin syytä.

### Näytteenottovälineet

Voit noutaa näytteenottovälineet SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta.

### Tarvittavat välineet:

- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra.

### Näytteenotto

1. Ota ripulivaiheen ulostetta puhtaaseen kertakäyttöastiaan. Kova ulostenokare ei kelpaa näytteeksi.
2. Avaa näytepurkki. Siirrä kannessa olevalla lusikalla ulostetta purkkiin. Puoli purkillista on riittävä määrä.
3. Sulje purkki huolellisesti. Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.

4. Varmista, että näytepurkissa on:
  - nimi
  - henkilötunnus
  - näytteenottopäivämäärä ja kellonaika.
5. Laita näytepurkki muovipussiin. Sulje pussi tiiviisti.

### Näytteen säilytys ja palauttaminen

Vie näytepurkki laboratorioon. Näyte säilyy huoneenlämmössä kaksi vuorokautta.



Tarvittava näytepurkki.

### Yhteystiedot

Satakunnan hyvinvointialue  
Laboratorio - SataDiag  
Ajanvaraus maanantaista perjantaihin kello  
10.00–15.00  
Puhelin 02 627 6410.