

Diabetes – insuliini-infuusio (heräämö, sydänvalvomo, teho)

Insuliini-infuusio

- Actrapid® 50ky 50ml:ssa NaCl 0,9% (=1ky/ml) / NovoRapid® tai Liprolog®
- Aloitus 4ml/tunnissa
- P-gluc 1 – 2 tunnin välein
- P-K 12 tunnin välein

Verensokeritavoite on vuodeosastolla 8-10mmol/l. Verensokerin korjaantumisen tavoitenopeus on 2-4mmol/l / tunnissa

Tavoiterajat muutetaan tarvittaessa

- Tuore diabetes, akuutti sydäntapahtuma tai aivoverenkierron häiriö
- Diabeettinen ketoasidoosi

P-gluk mmol/l	Infuusionopeuden säätö
yli 10	lisätään nopeutta 2ml/h
6 - 10	infuusionopeus ennallaan
4 - 6	infuusio suljetaan
alle 4	lyhytkestoinen glukoosi-infuusio

Insuliinihoito ei saa koskaan keskeytyä insuliiniriippuvaisen diabetespotilaan hoidossa.

Insuliini-infuusio voidaan lopettaa 2 tuntia pitkävaikutteisen insuliinin aloituksesta

Yhteystiedot

Sisätautien poliklinikka

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00

Puhelin 044 707 7974