

Kosketusvarotoimet (ripuli- ja oksennustauti)

Huoneen varustelu:

Huoneen
ovessa:
Värikoodi:
ruskea



Milloin käytän suojaimia?



Aina huoneeseen mentäessä. Puetaan desinfioiduin käsin sulussa tai huoneen ulkopuolella. Noro –infektiota sairastavan potilaan huoneessa käytetään FFP2-3 hengityksensuojainta, muulloin kirurgista suu-nenäsuojusta.



Huoneessa työskenneltäessä. Puetaan desinfioiduin käsin sulussa tai huoneen ulkopuolella. Käytetään nestettä hylkivää tai nestettä pitävää kuitutakkia tai pitkähihaista muoviesiliinaa.



Aina huoneeseen mentäessä. Puetaan desinfioiduin käsin potilashuoneessa. Vaihdetaan huoneessa tarvittaessa myös kesken työtehtävän aseptisen työjärjestyksen mukaan siirryttäessä likaisesta työvaiheesta puhtaaseen. Kädet desinfioidaan suojakäsineiden riisumisen jälkeen.

Suojavaatteiden riisuminen: Riisutaan potilashuoneessa olevaan mustaan jätessäkin suojakäsineet ja suojatakki, desinfioidaan kädet, riisutaan suu-nenäsuojus tai hengityksensuojain. Lopuksi kädet pestään vedellä ja saippualla ja desinfioidaan ennen huoneesta poistumista.

Potilaan kuljettaminen: Akuutti vaiheessa pyritään välttämään potilaan kuljettamista. Jos siirtoa tarvitaan, potilaalle annetaan oksennuspussi. Kuljetuksen jälkeen kuljettaja pesee kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet.

Siivous: Suojautuminen kuvan mukaisesti. Huoneessa kosketuspinnat pyyhitään huolellisesti 1000 ppm kloorilla tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöisellä puhdistusliinalla x2/vrk. Huonekohtaiset siivousvälineet.

