

Eristyspotilaan kuljettaminen sairaalassa

Kuljettajan suojauminen kuljetuksen aikana

Potilasta kuljettava henkilö ei yleensä tarvitse suojaimia kuljettaessaan potilasta sairaalan sisällä. Suojaimia käytetään vain silloin, kun potilas tarvitsee kuljetuksen aikana lähihoitoa. Tällöin käytetään potilaan hoidossa käytettävän varotoimiluokan edellyttämiä suojaimia. Jos potilasta kosketetaan suojakäsinein kuljetuksen aikana, ne tulee poistaa heti kosketuksen jälkeen ja desinfioida kädet ennen ympäristöpintojen koskettamista.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoja ei kuljeteta potilaan vuoteessa. Jos niiden kuljettamiseen ei ole muuta mahdollisuutta, potilasasiakirjat kuljetetaan muovipussissa, joka pannaan kuljetuksen päättyessä roskiin.

Potilaan suojauminen

Jos potilasta hoidetaan pisaraeristyksessä, hänelle annetaan kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-
nenäsuojus. Ilmaeristyksessä hoidettavalle potilaalle asennetaan venttiilitön FFP2 tai FFP3 –
hengityksensuojain. Jos potilas ei pysty pitämään hengityksensuojainta, hänet ohjataan
suojaamaan hengitystiet esim. nenäliinalla ja yskimään siihen.

Eristyspotilaat pyritään toimenpideyksiköissä kuljettamaan suoraan toimenpidehuoneeseen ja
suoraan sieltä takaisin hoitavaan yksikköön. Kuljettaja desinfioi kätensä aina ennen
potilaskuljetusta ja sen jälkeen.