

Infliksimabi INFLECTRA®, REMICADE®, REMSIMA®, ZESSLY® reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Infliksimabia käytetään mm. nivelreuman, selkärankareuman, nivelpsoriaasin ja lastenreuman hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Infliksimabi kuuluu biologisten lääkeaineiden ryhmään. Sytokiinit, solujen väliset viestinviejäaineet, ylläpitävät tulehdusreaktiota nivelreumassa ja muissa tulehduksellisissa nivelsairauksissa. Tulehduksen kannalta keskeisimpiä sytokiinejä on mm. kasvainnekroositekijä (Tumor Necrosis Factor, TNF). Infliksimabi on kasvainnekroositekijän TNF vasta-aine ja se neutraloi TNF:n biologista aktiivisuutta. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä sekä nivelten vaurioitumista

Annostus ja antotapa

Infliksimabia on saatavana sekä infuusiona että itse pistettävänä valmisteena. Infuusio annetaan suonensisäisenä tiputuksena 3-5 mg/kg kerta-annoksena. Hoito uusitaan 2 viikon ja 6 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Tämän jälkeen hoito annetaan yleensä 8 viikon välein. Itsepistettävässä valmisteessa tavallinen annos on 120 mg ihon alle kahden viikon välein.

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. hengitysinfektiot, ihottuma, kutina, päänsärky, sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja veren kuvan muutokset. Allergiset reaktiot ovat melko harvinaisia. Infliksimabi saattaa lisätä alttiutta infektioihin. Lääke tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi. Tuberkuloosiin sairastumisen riski on selvitetävä jo ennen hoidon aloitusta.

Raskaus ja imetys

Infliksimabi lopetetaan, kun raskaus todetaan. Sen käyttöä voidaan harkita raskausviikolle 20 saakka. Lääkettä voidaan käyttää imetyksen aikana ensimmäisen imetysviikon jälkeen.

Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan ennen lääkeinfuusiota ja ennen lääkärin vastaanottoa.

Muuta huomioitavaa

Infliksimabi tauotetaan ennen leikkausta. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos annettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen luonne ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektioriski ja perussairauden uusiutumisriski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen noin kahden viikon kuluttua leikkauksesta, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

LINKKI [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612