

Iriitin eli värikalvotulehduksen lääkehoito

1. viikko

Kortisonitippa (esimerkiksi Dexa tai Pred Forte®)
1-2 tippaa tunnin välein kipeään silmään valveillaoloaikana

Mustuaista laajentava tippa (esimerkiksi Oftan Tropicamid®)
1 tippa kolme kertaa päivässä

Dexa tai Ultracortenol voide yöksi

Pidä noin 5-10 minuutin tauko eri tippojen välillä!

2. viikko

Dexa tai Pred Forte tippa joka toinen tunti valveillaoloaikana
Tropicamid 1 tippa kerran päivässä
Dexa tai Ultracortenol voide yöksi

3. viikko

Dexa tai Pred Forte-tippa viisi kertaa päivässä
Dexa tai Ultracortenol voide yöksi
Ei laajennustippaa

4. – 6. viikko

Dexa tippa 2-3 kertaa päivässä. Jos hoidon päätyttyä silmään on jäänyt särkyä tai näkö huonoksi, ota yhteys silmäpoliklinikkaan.

Halutessasi voit käydä terveystarkastuksen omaisesti tarkastuskäynnillä omalla silmälääkärillä yksityispuolella.

Yhteystiedot

Silmätaudit M2, Puhelin 02 627 7841
Maanantaista perjantaihin kello 08.00 – 15.00