

Keuhkovaltimon varjoainekuvaus ja pallolaajennus

Sinulle on suunniteltu tehtäväksi keuhkovaltimoiden varjoainekuvaus ja tulosten perusteella myös pallolaajennushoito.

Ennen tutkimusta

Ota lääkkeesi normaalisti, mikäli et ole saanut muita ohjeita.

Ole syömättä **vähintään neljä tuntia** ennen sairaalaan tuloa, vettä voit juoda vähän.

Tutkimuksen aikana

Tutkimus tehdään paikallispuudutuksessa nivuslaskimon kautta röntgenläpivalaisussa. Tutkimus on paikallispuudutusta lukuun ottamatta kivuton. Tutkimus kestää noin kaksi tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Vointiasi seurataan sairaalassa seuraavaan päivään.

Tutkimuksen tulokset kuulet joko toimenpiteen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana.

Toimenpide toistetaan yleensä muutaman kerran.

Tutkimuksen turvallisuus

Tutkimus ei ole täysin vaaraton, mutta vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia. Sairauteesi liittyen voi tulla yskää ja hengenahdistusta tutkimuksen aikana.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön

Jos epäilet olevasi raskaana. Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä. Lievä nuhaisuus ei estä tutkimusta, mutta kuume tai kova flunssa on este tutkimukselle.

[Sydänsairaudet.fi](https://www.sydaensairaudet.fi) tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Yhteystiedot

Sydänyksikkö
Hoidonvaraaja, puhelin 044 707 9381
Maanantaista perjantaihin kello 09.00-12.00