

Koepalan otto eturauhasesta

Olet tulossa urologin vastaanotolle eturauhaskoepalojen ottoa varten.

Toimenpiteen tulehdusriskin vuoksi tarvitset edeltävän antibioottilääkityksen. Lääkkeen saat kirurgian poliklinikalta ja tämän vuoksi sinut on kutsuttu hoitajavastaanotolle tuntia ennen lääkärin vastaanottoa.

Jos olet ollut 3kk sisällä matkalla Itä- tai Etelä-Euroopassa, Aasiassa, Lähi-Idässä tai Afrikassa, ota yhteyttä mahdollisimman pian kirurgian poliklinikan urologiseen hoitajaan, puh. 044 7079776 ma-pe klo 8-14.

Toimenpide

Näyte otetaan paikallispuudutuksessa peräsuoleen laitettavan ultraäänilaitteen avulla. Toimenpide kestää noin 15 minuuttia. Kipua voi tuntua neulanpiston verran. Toimenpiteen jälkeen voit heti kotiutua.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen voi viettää normaalia elämää. Koepalojen oton jälkeen virtsan joukossa voi olla verta jonkin aikaa. Myös ulosteen ja siemennesteen joukossa voi verta esiintyä muutaman viikonkin ajan.

Mahdolliseen kipuun voi tarvittaessa ottaa käsikauppalääkkeitä, esim. Burana ® tai Panadol ®.

Muuta huomioitavaa

Tutkimus ei vaadi esivalmisteluja, omat lääkkeet saa ottaa normaalisti.

Koepalavastaus valmistuu noin kolmen viikon kuluttua näytteenotosta. Lääkäri on sinuun yhteydessä kirjeitse tai puhelimitse ja sopii tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Yhteydenotot

Ota yhteyttä päivystykseen jos sinulle

- nousee kuume
- tulee alavatsakipua tai et saa virtsattua
- tulee runsasta verenvuotoa