

Kohdun tähystys ja/tai kaavinta

Yleistä

Kohdun tähystys eli hysteroskopia on tutkimusmenetelmä, jossa tähystin viedään kohtuonteloon emättimen kautta. Tähystimen kautta tarkastellaan kohdun limakalvoa ja etsitään syytä esimerkiksi vuotohäiriölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi polyypit tai myoomat. Tähystyksen yhteydessä suoritetaan tarvittaessa myös kohtuontelon kaavinta. Toimenpide tehdään nukutuksessa.

Hygienia

Toimenpiteen jälkeen saattaa olla veristä vuotoa muutaman päivän ajan. Alapesusta tulee huolehtia aamuin illoin pelkällä vedellä. Yhdyntää, tamponien käyttöä ja uimista on vältettävä verisen vuodon ajan.

Kivun hoito

Yleensä kotona kivun hoidoksi riittävät ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet.

Kuukautiset

Jos sinulla on vielä kuukautiset, niin seuraavat kuukautiset tulevat 4-6 viikon kuluessa.

Jatkohoito

Tarvittaessa sovitaan jälkitarkastus ja jatkohoito gynekologian poliklinikalle. Lääkäri laittaa koepalavastaukset ja jatkosuunnitelmat Kanta-arkistoon noin 4-6 viikon kuluttua.

Ota yhteyttä, jos

- verenvuoto on runsasta tai pahan hajuista
- on alavatsakipua, johon kipulääkkeet eivät auta
- nousee kuumetta yli 38 °C

Yhteystiedot

Synnytysten ja naistentautien päivystyshoitaja, puhelin 044 707 7822