

Kortisonihoito ja hyperglykemia polikliinisella potilaalla Potilaan ohjaus verensokeriseurantaan

Kortisonihoitoa aloitettaessa on hyvä muistaa sen vaikutus verensokeriarvoihin. Diabeetikoilla sokeriarvot nousevat aina kortisonihoidon aikana. Kortisonihoito voi nostaa myös ei-diabeetikon verensokeria. Tällöin taustalla voi olla heikentynyt glukoosinsieto ja metabolinen oireyhtymä. Verensokeria nostava vaikutus alkaa useita tunteja kortisonin oton jälkeen.

Jos **ei-diabeetikolle** aloitetaan kortisonihoito vastaanoton yhteydessä, voit ohjata potilaan Satasairaalan sisätautien poliklinikalle

(Pori) konsultoiva diabeteshoitaja puh 044 707 7985

(Rauma) diabeteshoitajille puh. 050 473 5913 tai 050 473 5911

Annamme tuolloin verensokerinseurantaan tarvittavan verensokerimittarin ja liuskat. Jos verensokeriarvot nousevat, ohjeistamme hoidon.

Diabeetikko, jolle aloitetaan kortisonihoito: Muistuta, että verensokerien seuranta ja hoitoa on tehostettava. Potilas voi olla yhteydessä omaan diabeteshoitajaansa ja tarvittaessa myös Satasairaalan diabeteshoitajaan p. 044 707 7974

Yhteystiedot

Sisätautien poliklinikka

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00

Puhelin 044 707 7974