

## Korvaleikkaus

---

### Tietoa korvaleikkauksesta

Korvaleikkaus voidaan tehdä monesta syystä:

- tärykalvon reikä, joka ei ole umpeutunut itsestään ja aiheuttaa kuulon alenemaa ja/tai tulehduskierrettä.
- otoskleroositauti joka aiheuttaa kuuloluiden jäykistymistä eli luutumista niin, etteivät ne toimi normaalisti ja kuulo alenee.
- kolesteatomatauti eli helmiäiskasvain kasvattaa hilsemassaa, joka voi lopulta syövyttää välikorvan ja korvalokeroston luisia rakenteita.
- äkillinen kartiolisäkkeen tulehdus on välikorvatulehduksen komplikaatio. Tulehdus leviää kartiolisäkkeen lokeroihin täyttäen ne tulehduskudoksella.
- korvakäytävän leikkaus esim. exostoosin eli uimarin kyhmyjen aiheuttaman ahtauden vuoksi

### Tietoa toimenpiteestä

Korvaleikkaus tehdään yleensä nukutuksessa.

Otoskleroosileikkaus ja tärykalvopaikkausleikkaus voidaan tehdä myös paikallispuudutuksessa. Sairaalahoidon pituus riippuu tehdystä toimenpiteestä ja potilaan voinnista. Osa leikkauksista voidaan tehdä päiväkirurgisesti.

### Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen korvassa voi kuulua rasahtelua ja tuntua kutinaa tai pientä pistelyä, tämä on normaalia. Nukutusaineet voivat aiheuttaa pahoinvointia. Leikkauksen jälkeen voi tuntua myös kipua. Kipu- ja pahoinvointilääkettä annetaan tarpeen mukaan. Tasapainon ja makuaistin häiriöitä voi myös esiintyä ja ne ovat useimmiten ohimeneviä. Sairauslomaa kirjoitetaan yleensä noin 2 viikkoa.

Leikatussa korvassa on yleensä tamponatio, jonka vuoksi korvalla ei kuule normaalisti. Tamponatio on joko sulavaa (sulatetaan korvatipoin) tai poistettavaa. Korvasta voi alkupäivinä tulla hieman veristä eritettä, joka imeytyy ensimmäisen toipilasviikon aikana päivittäin korvakäytävän suulle vaihdettavaan pumpuliin. Leikattua korvaa ei saa puhdistaa itse, vaan lääkäri puhdistaa korvan ja mahdolliset tamponit jälkitarkastuksessa. Kipulääkettä kannattaa ottaa ensimmäisinä päivinä ohjeen mukaan ja myöhemmin tarvittaessa.

### Korvaleikkauspotilaan kotihoito-ohje

Jos pään ympärillä on sidos tai korvan päällä taitokset, ne voi poistaa leikkausta seuraavana päivänä. Myös mahdollinen kostea, usein verinen pumpuli poistetaan korvakäytävän suulta. Korvalehden voi puhdistaa puhtaalla kostealla taitoksella. Korvan sisään ei saa mennä.

1. viikko  
päivittäin vaihdetaan puhdas, kuiva pumpuli korvakäytävän suulle, jos korvassa on sulavat tamponit. Jos korvassa on poistettavat tamponit, ei pumpulia käytetä. Saat tästä ohjeet toimenpiteen jälkeen.
2. viikko  
Korva saa nyt hengittää, pumpulia ei enää laiteta korvakäytävän suulle. Edelleen suihkussa ja pesuissa korvan suojaus vedeltä (silikonikitin tai rasvapumpulin avulla ja hiustenpesujen yhteydessä lisänä suojaamassa mukin korvaa peittämässä).
3. viikko  
Tamponaatiota sulattavien korvatippojen käyttö alkaa. Reseptiin on merkitty aloituspäivä ja annostusohje. Tipat jatkuvat kontrolliin saakka tai kunnes pullo on tyhjä.

### **Ehdottomat rajoitukset:**

- **leikatun korvan päällä ei saa nukkua 2 yönä leikkauksen jälkeen**
- **2 viikon ajan niistämis-, rasitus- ja ponnistelukiello sekä ehdoton leikatun korvan kastelukiello!**

Leikkauksen ensimmäinen jälkikontrolli on noin kuukauden kuluttua, mikäli korvassa on sulavat tamponit ja tällöin lääkäri puhdistaa ja tarkastaa korvan. Sulamattomat tamponit poistetaan jo viikon kuluttua leikkauksesta.

Jälkitarkastusajan ja sairauslomatoimituksen saat kotiutuessasi sairaalasta. Lääkeresepit on yleensä kirjoitettu valmiiksi jo leikkausta edeltävällä poliklinikkakäynnillä. Jos haavalla on poistettavia ompeleita, niiden poisto tapahtuu omassa terveyskeskuksessa viikon kuluttua leikkauksesta.

### **Yhteys lääkäriin**

ota yhteyttä leikkauksen tehneeseen sairaalaan, jos

- kuume nousee 38° tai sen yli
- ilmaantuu voimakasta huimausta tai pahoinvointia
- korvasta vuotaa runsaasti verta tai muita eritteitä
- korvakipu lisääntyy eivätkä kipulääkkeet auta
- 

### **Yhteystiedot**

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00

Puhelin 050 473 5086

Tai päivystysaikaan puhelin 116 117