

## Laserhoito silmän paineen alentamiseen (SLT)

---

Silmänpainetautiin liittyvää silmänpaineen nousua voidaan laskea myös silmän etuosan rakenteisiin kohdistuvalla laseroinnilla (SLT/LTP). Laseroinnilla lisätään silmänsisäisen nesteen poistumista ja sitä kautta pyritään laskemaan silmänpainetta. Hoito tehdään silmätautien poliklinikalla.

### Toimenpide

Toimenpidettä varten mustuaista ei laajenneta. Silmän pinta puudutetaan puudutustipoilla ja silmän pinnalle laitetaan pieni kontaktilinssi. Linssin läpi kohdennetaan lasersäde halutulle alueelle.

Toimenpide on kivuton ja nopea. Hoidon teho on yksilöllinen. Yhteen silmään voi tulla useampia hoitokertoja.

### Toimenpiteen jälkeen

Laser-hoidetussa silmässä voi olla valonarkuutta ja roskan tunnetta parin päivän ajan. Hoidettua silmää ei tarvitse peittää.

Toimenpiteen jälkeen ei ole rajoituksia, ellei asiasta erikseen mainita.

Silmäsairauden seuranta jatkuu aiempaan tapaan. Muut käytössä olevat silmälääkkeet ja muut lääkkeet jatkuvat entiseen tapaan, ellei lääkäri toisin määrää.

### Matkakorvaukset

KELA korvaa matkakulut yleisen kulkuneuvon mukaan (linja-auto).

### Yhteystiedot

Silmätaudit M2, Puhelin 02 627 7841  
Maanantaista perjantaihin kello 08.00 – 15.00