

Meckelin divertikkelin gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa selvitetään mahdollisen mahalaukun limakalvoa sisältävän umpipussin olemassaoloa suolistossa.

Esivalmistelut

- Sinun on oltava syömättä 12 tuntia ennen tutkimuksen alkua. Vettä voi juoda hiukan, ei kuitenkaan neljään tuntiin ennen tutkimusta.
- Jos epäilet olevasi raskaana tai imetät, mainitse asiasta vastaanottavalle hoitajallesi. Tällöin on noudettava tiettyjä varotoimia.

Tutkimuksen kulku

Radiolääke annetaan pistoksena kyynärvarren laskimoon, ja kuvaus alkaa heti tämän jälkeen. Kuvaus suoritetaan makuuasennossa ja kuvauksessa voit käyttää omia vaatteita.

Tutkimuksen kesto

Kuvauksen kesto on noin tunti, mutta tarvittaessa kuvataan vielä lisäkuvia mahdollisimman tarkan tuloksen saamiseksi. Tutkimukseen kokonaisuudessaan on syytä varata aikaa noin puolitoista tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Lääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon, joka ohjataan lähetteen tehneelle poliklinikalle tai osastolle. Lähettävä yksikkö huolehtii jatkotoimenpiteistä.

Muuta

Tutkimuksessa käytetään pientä määrää radioaktiivista merkkiainetta, joka lähettää säteilyä. Siksi kehotamme sinua välttämään oleskelua lasten tai odottavien äitien lähellä noin vuorokauden ajan merkkiaineen annosta. Merkkiaine poistuu elimistöstäsi tänä aikana.

Osastolla on hajusteiden käyttö kielletty allergia- ja astmapotilaiden vuoksi!

Yhteystiedot

Isotooppilääketiede ja PET
Satasairaala, A-rakennus, 0. kerros
puhelin 02 627 7361
maanantaista perjantaihin kello 7.00–14.30