



Mikropulssisyklodilaser –toimenpiteeseen tulevalle

Olet tulossa leikkaussalissa tehtävään lasertoimenpiteeseen. Toimenpiteellä pyritään vähentämään silmän kammionesteen tuottoa ja tämän seurauksena alentamaan silmänpainetta. Toimenpide tehdään leikkaussalissa paikallispuudutuksessa. Ilmoita mahdollisista puuduteaineallergioista silmätautien poliklinikalle etukäteen. Verenohennuslääkitys on tauotettava mahdollisuuksien mukaan ennen toimenpidettä.

Lääketauotukset

Jos sinulla on käytössä jokin verenohennuslääke, pidä taukoa lääkkeen ottamisesta ennen toimenpidettä seuraavan ohjeen mukaan:

Kahden viikon tauko:

Aspirin, Aspirin Cardio, Aspirin-C
Disperin, Primaspan, Asasantin retard

Kahden päivän tauko:

Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Plavix ja Clopidogrel

Omega-3 tai siihen rinnastettavissa olevat valmisteet tulisi olla tauossa vähintään kaksi viikkoa ennen toimenpidettä.

Kaikki nämä valmisteet lisäävät verenvuotoriskiä toimenpiteen aikana. Toimenpiteen jälkeen lääkevalmistetta voi käyttää normaalisti. **Jos sinulla on keinoläppä, ei lääkettä tauoteta.**

Toimenpiteen jälkeen

Laserhoidon jälkeen silmän päälle laitetaan lappu, jota pidetään iltaan/ seuraavaan aamuun asti. Toimenpiteen jälkeen saat hoito-ohjeet ja pääset kotiin. Toimenpidepäivänä autolla ajo on kielletty. Ensimmäisenä iltana silmässä voi tuntua voimakastakin särkyä. Voit ottaa kipuun särkylääkettä. Saunomista ei suositella viikkoon, koska saunan lämpö voi aiheuttaa ärsytysoireita laserhoidettuun silmään. Silmänpainelääkitys jatkuu ennallaan. Lisäksi saat reseptin Oftan Dexa-Chlora-silmätipoista, joita käytetään toimenpidesilmään neljästi päivässä kahden viikon ajan.

Yhteystiedot

Silmätaudit M2, Puhelin 02 627 7841
Maanantaista perjantaihin kello 08.00 – 15.00