

Munatorvien aukiolotutkimus

SSG-tutkimus on ultraäänitutkimus, jolla selvitetään munatorvien aukioloa. Tutkimus tehdään lapsettomuuspoliklinikan vastaanotolla kuukautiskierron alkupuolella kuukautisvuodon loputtua (yleensä kuukautiskierron päivänä 5-10).

Tutkimuksessa ruiskutetaan ohuen katetrin avulla kohtuonteloon keittosuolaliuoksen ja ilman seosta. Samanaikaisesti seurataan ultraäänellä nesteen ja ilmakuplien etenemistä munatorvissa ja niiden kertymistä vatsaonteloon kohdun taakse. Samalla voidaan todeta mahdolliset kohtuontelon poikkeavuudet kuten polyyppi (hyvänlaatuinen limakalvokasvain), myooma (kohdun hyvänlaatuinen lihaskasvain) tai kohdun väliseinä. Tutkimus kestää muutamia minutteja.

Tutkimus saattaa aiheuttaa jonkin verran kipua. On hyvä ottaa kipulääkettä, esim. Burana® 600mg ja/tai Panadol® 1g tbl noin tuntia ennen vastaanottoa kohdun supistelun ehkäisemiseksi.

Tutkimuksen jälkeen saattaa esiintyä jonkin aikaa hartiapistosta, johtuen vatsaonteloon menneestä nesteestä. Huuhtelunestettä (usein verensekaista) valuu tutkimuksen jälkeen myös emättimestä jonkin aikaa, jonka vuoksi tulee käyttää sidettä.

Jos munatorvien aukiolo jää SSG-tutkimuksessa epäselväksi tai on muuta lisätutkimuksen tarvetta, voidaan sopia nukutuksessa tehtävä laparoskopia eli vatsaontelon tähystys ja sen yhteydessä tehtävä munatorvien aukiolotutkimus (perlavatio). Laparoskopia on päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään päiväkirurgian yksikössä.

Hysteroskopia eli kohtuontelon tähystys tehdään, jos epäillään kohtuontelon rakenteellista poikkeavuutta. Hysteroskopia tehdään joko naistentautien poliklinikalla vastaanottokäynnin yhteydessä tai nukutuksessa päiväkirurgian yksikössä.

Yhteydenotot

Jos sinulla on lapsettomuuteen tai lapsettomuuden tutkimuksiin liittyvää kysyttävää, voit soittaa lapsettomuuspoliklinikalle hoitajan soittoajalla:

tiistaina klo 7.30–8.00 ja klo 15.15–15.45,

keskiviikkona klo 15.00-15.45 sekä

perjantaina klo 8.00-9.00,

puhelin (02) 627 7820