

Mykofenolaatti, CELLCEPT[®], MYCOPHENOLATE MOFETIL[®], MYFENAX[®], MYFORTIC[®] - reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Mykofenolaattia käytetään systeemisten sidekudossairauksien, erityisesti SLE:n, lihas- ja verisuonitulehdusten sekä sidekudossairauksiin liittyvän keuhkofibroosin hoitona.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Lääke estää tulehdusreaktiota ylläpitävien lymfosyyttien toimintaa. Vaikutus on solunsalpaajien kaltainen. Lääkkeen teho ilmaantuu muutaman kuukauden kuluessa.

Annostus ja antotapa

Mykofenolaatin tavallisimmin käytetty annos sidekudossairauksissa on ollut 1-2 g vuorokaudessa jaettuna kahteen annoserään. Lääke voidaan annostella kapselina, tablettina tai nestemäisenä. Lääke voidaan ottaa tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä, mielellään runsaan nesteen kera.

Haittavaikutukset

Mykofenolaatin tavallisimpia haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan ärsytysoireet (ripuli ja pahoinvointi), veren valko- tai punasolujen määrän aleneminen, maksan toimintakokeiden muutokset, makuhäiriöt, lihasheikkous ja nivelkivut. Mykofenolaatti voi lisätä alttiutta infektioille. Lääkettä ei anneta vakavan infektion aikana.

Raskaus ja imetys

Mykofenolaattia ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Perheellisäystä suunniteltaessa on suositeltavaa, että lääkitys lopetetaan kuusi viikkoa ennen raskaaksi tuloa.

Seuranta

Lääkkeen aloituksesta turvakokeet **2-3, 6 ja 12 viikon välein, sitten 3-6 kk välein**. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat **PVK, B-NEUT ja ALAT**. **KREA, U-Kemseu, CRP ja LA** tutkitaan hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 välein.

Muuta huomioitavaa

Leikkausten yhteydessä lääkettä ei tarvitse tauottaa, ellei haavan paranemisen kanssa ole ollut ongelmia. Elävää heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita voidaan antaa hoidon aikana.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet](#) | [Reumatalo.fi](#) | [Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612