

Nukutuksessa tehtävä mahantähystys

Sinulle on varattu aika mahantähystykseen eli gastroskopiaan.

Mahantähystyksessä tutkitaan ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairauksia sekä toiminnallisia häiriöitä.

Lääkäri tekee tutkimuksen taipuisalla tähystimellä.

Hän ohjaa sen suun kautta ruokatorveen, siitä mahalaukkuun ja pohjukaissuoleen asti. Tähystys voi aiheuttaa täyteläisyyden tunnetta vatsassa.

Pystyt kuitenkin hengittämään normaalisti koko tähystyksen ajan.

Tähystyksessä lääkäri tutkii mahalaukun limakalvot ja ottaa tarvittaessa koepaloja. Koepalan ottaminen ei aiheuta kipua.

Huomioitavaa

Soita tutkimusyksikköön viimeistään viikko ennen tutkimusaikaa, jos:

- sinulla on käytössäsi veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys, etkä ole saanut kutsukirjeen mukana ohjetta lääkkeen annostelusta tutkimusta edeltävinä päivinä. Veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä ovat esimerkiksi Marevan®, Plavix® tai Pradaxa®
- sinulla on diabetes, jota hoidat insuliinilla

Voit ottaa säännöllisesti käytössäsi olevat lääkkeet normaalisti veden kanssa.

Ota lääkkeet viimeistään 2 tuntia ennen tähystystä.

Tutkimuspäivänä

TUTKIMUSPÄIVÄNÄ SINUN TULEE OLLA SYÖMÄTTÄ JA JUOMATTA TUTKIMUSPÄIVÄNÄ ENNEN SAIRAALAAN TULOJA

Varaudu siihen, että voit joutua odottamaan jonkin aikaa toimenpiteen alkua.

Toimenpiteen jälkeen seuraamme vointiasi tähystysyksikön tiloissa.

Saat kevyen välipalan, kun vointisi sen sallii.

Kotiutuminen

Kotiudut 1-2 tunnin kuluttua toimenpiteen jälkeen.

Kotiutumiseen ajankohtaan vaikuttavat käytetyn lääkkeen määrä ja vointisi.

Tärkeää

Et voi ajaa moottoriajoneuvoa toimenpiteen jälkeen eli järjestä itsellesi hakija.

Nukutuksen vuoksi tarvitset aikuisen seuralaisen kotiisi.

Jos sinulla ei ole tällaista henkilöä saatavilla, soita puhelinnumeroon 02 627 7965

Yhteystiedot

Tähystysyksikkö
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 02 627 7961