

Ohutsuolen tietokonetomografiatutkimus

Tilauuskoodit

JF1BD Ohutsuolen laaja tietokonetomografiatutkimus

Potilasohje

[Ohutsuolen tietokonetomografia](#)

Ajanvaraus

HUOM! Potilaalle varataan aika aamupäivään.

Valmistautuminen tutkimukseen

Metformiini ja muut nefrotoksiset lääkkeet

Metformiinia ei tarvitse tauottaa jodivarjoainekuvaukseen.

Normaalisti metformiinia ei myöskään tarvitse tauottaa jodivarjoainekuvauksen jälkeen, ellei gfr ole <45.

Myöskään kreaa ei tarvitse kontrolloida jälkikäteen, mikäli se on normaali.

Erityisohje on vain riskiryhmille.

- Katso erillisohje [Varjoaineiden käyttö riskiryhmissä](#). Tarkista ohjeesta myös muut riskiryhmien toimintaohjeet.
- **Lähetävä yksikkö huolehtii kontrollin munuaisfunktion suhteen tutkimuksen jälkeen ja tauotettujen lääkkeiden (metformiini ja muut nefrotoksiset lääkkeet) uudelleenaloituksen.**
- **Potilasta ohjeistetaan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön varjoainetutkimuksen jälkeen, jos gfr on alle 45.**
- Metformiinia sis. lääkkeet esimerkiksi Competact, Diformin retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin Actavis, Metformin Mylan, Metformin Stada, Metformin Vitabalans, Oramet, Oramet-Hexal, Segluromet, Synjardy, Velmetia, Vipdomet, Xigduo.

Krea/GFR

- fP-Krea/P-Krea (voidaan ottaa myös TK:ssa)
 - alle 3kk vanha arvo riittää, jos potilaalla ei epäillä munuaissairautta
 - korkeintaan 2 vrk vanha arvo, mikäli potilaalla on tai voidaan epäillä olevan munuaissairaus

HUOM! Krea/GFR-arvo on otettava riittävän ajoissa, jotta se on käytettävissä potilaan tullessa tutkimukseen.

Tutkimuspäivänä

- Potilaan tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen tutkimusta, vettä voi juoda vähän.
- Osastopotilas: potilaalle laitetaan osastolla valmiiksi i.v. kanyyli ennen tutkimusta (vihreä kanyyli kyynärtaipeen laskimoon).
- Potilas tulee kuvantamiseen 1,5 tuntia ennen tutkimusta juomaan varjoainetta, jota juodaan 1,5 dl kerrallaan 10 minuutin välein.
- Virtsarakossa tulee olla virtsaa tutkimusta tehtäessä.
- Mikäli potilaalla on virtsakatetri, se on suljettava 1 tunti ennen tutkimusta.

Tutkimuksen jälkeen

- Ennen tutkimusta juotava varjoaine saattaa aiheuttaa ripulia tutkimuksen jälkeen.
- Potilaalle suositellaan tutkimuksen jälkeen runsasta nesteytystä suonensisäisesti annetun jodivarjoaineen mahdollisen munuaistoksisuuden estämiseksi (p.o. tai i.v.).