

Oskillometrinen hengityselimistön impedanssi

Tutkimus antaa tietoa keuhkokudoksen ja hengitysteiden tilasta. Sitä käytetään usein astman diagnostiikassa ja hoidon seurannassa alle kouluikäisillä lapsilla.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimus ei vaadi erityistä ennalta valmistautumista.

Hajusteiden käyttö osastollamme on kielletty.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa lapsi istuu ja hengittää samalla lepo hengitystä tutkimuslaitteeseen. Tutkimus on kivuton.

Tutkimukseen on hyvä varata aikaa noin tunti.

Tutkimuksen esteet

Jos lapsi on nuhakuumeessa, tai antibioottikuurilla hengitystieinfektion vuoksi, tutkimusta ei tehdä.

Jos lapsi on sairastanut koronan, hänen pitää parantua kunnolla ennen tutkimuksen suorittamista. Tutkimus tehdään vasta 14–20 vuorokautta sen jälkeen, kun lapsi on parantunut.

Jos lapsi on saanut positiivisen koronatuloksen, mutta hänellä ei ole oireita, tutkimus voidaan tehdä 10 vuorokautta tuloksen jälkeen.

Jos lapsi on sairastanut koronan jälkeisen keuhkokuumeen, tutkimus tehdään vasta 2–3 kuukautta sen jälkeen, kun hän on parantunut.

Jos lapsi on saanut koronarokotteen, tutkimus voidaan tehdä vasta kolme vuorokautta rokotteen saamisen jälkeen.

Mahdollisen tartuntariskin vuoksi myöskään lapsen mukana oleva aikuinen ei saa olla sairaana.

Ota näissä tapauksissa yhteyttä hoitavaan yksikköön.

Ilmoittautuminen

Kun tulet tutkimukseen, ilmoittaudu sairaalafysiologian yksikköön B-rakennuksessa, 0. kerroksessa.

Mikäli et pääse saapumaan tutkimukseen, ilmoita siitä mahdollisimman pian.

Puhelinnumero on 02 627 7362.

Jos et pääse paikalle ja peru aikaa, sairaala perii maksun peruuttamattomasta ajasta.

Yhteystiedot

Sairaalafysiologia

puhelin 02 627 7362,

maanantaista perjantaihin kello 7.00–14.30.

SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi