

Pentamidiinihoito

Indikaatio

Sulfa-allergisten potilaiden infektioiden ehkäisy ja hoito. Erityisesti elinsiirtopotilaiden Pneumocystis carinii –profylaksia ja hoito. Vaikuttavana aineena on pentamidiini-isotionaatti.

Kontraindikaatio

Raskaana olevien, tai raskaaksi aikovien naisten ei tulisi altistua pentamidiinille.

Hoidon periaate

Potilas inhloi pentamidiini -laimennosta aerosolina inhalaatioannostelijalla, kunnes sumutin on tyhjä.

Potilaan valmistautuminen ennen hoitoa

Potilaan annossuunnittelun aikatauluineen tekee lähettävä lääkäri ja toimittaa sen KLF:lle. Tarvittaessa konsultoi hygieniayksikön ylilääkäriä.

Hoidon kulku

Hoitokerrat ja niiden aikavälit määräytyvät lähettävän lääkärin ohjeen mukaan ja ne voivat vaihdella potilaskohtaisesti. Tyypillisesti ensimmäinen hoitokerta on noin 2-3 viikkoa elinsiirrosta. Kaksi seuraavaa hoitokertaa suoritetaan kahden viikon välein ja seuraavat neljän viikon välein, kunnes elinsiirrosta on kulunut puoli vuotta.

Erityistä huomioitavaa

Hoito tilataan puhelimitse KLF-laboratorion kansliasta. Aika varataan päivän viimeiseksi ajaksi. Jos hoidon takia halutaan muuttaa potilaan lääkitystä, on siitä mainittava läheteessä.

Yhteystiedot

Sairaalafysiologia
Satasairaala, B-rakennus, 0. kerros
puhelin 050 511 5088
maanantaista perjantaihin kello 7.00–15.00

SataDiag
[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)