



Peräpukamien kumilenkkihoidon (Barron ligaatio) jälkeen

Sinulta on tähystyksen yhteydessä ___/ ___ 20___ hoidettu sisäisiä peräpukamia ja laitettu ___ kpl Barronin kumilenkkiligatuuria peräpukamien hoidoksi. Peräpukama ja kumilenkki irtoavat itsestään noin 7-10 vuorokauden kuluttua toimenpiteestä. Tällöin voi tulla pientä verenvuotoa peräaukosta.

Ohjeet kotiin

Kumilenkkien asettamisen jälkeen saattaa peräaukon seudussa esiintyä täyttävää tunnetta tai kipua muutaman vuorokauden ajan.

Ota kipuun sinulle määrättyä / sopivaa kipulääkettä.

Suihkuttele peräaukon seutua tulee aina ulostamisen jälkeen kumilenkkihoidon jälkeisinä päivinä.

Pidä suolen sisältö pehmeänä noin viikon ajan toimenpiteestä nauttimalla riittävästi nesteitä sekä kuitupitoista ruokaa.

Mikäli sinulle ilmaantuu seuraavan kolmen vuorokauden sisällä

- voimakasta kipua, joka ei asetu kipulääkkeillä
- verisiä ulosteita
- yli vuorokauden kestänyt 38 ° C kuumeilu

Ota yhteys sinua hoitaneeseen yksikköön tai päivystyspoliklinikalle.

Yhteystiedot

Tähystysyksikkö

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00

Puhelin 02 627 7961

Kirurgian poliklinikka

Maanantaista perjantaihin kello 9.00- 14.00

Puhelin 044 7073814

Rauman Tähystysyksikkö

Maanantaista perjantaihin kello 9.00- 12.00

Puhelin 02 627 8698