

Peräsuolen varjoainekuvaus eli defekografia

Miksi tutkimus tehdään

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen toimintaa ja sitä, laskeutuuko lantion pohja ulostamisen yhteydessä.

Tutkimus tehdään, kun potilaalla on vaikeuksia ulostamisessa, tunne peräsuolen huonosta tyhjenemisestä tai peräsuolen esiinluiskahdus.

Tutkimukseen valmistautuminen

Syö ja juo normaalisti.

Saavu kuvantamiseen 1,5 tuntia ennen varattua tutkimusaikaa esivalmisteluja varten.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, ota yhteyttä siihen poliklinikkaan tai osastoon, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Jos sinulla on kudostenesteen sokeria mittaava sensori, kerro siitä röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

Miten tutkimus tehdään

Saat juotavaksi 700 millilitraa varjoainetta 1,5 tuntia ennen tutkimuksen aloittamista.

Kun olet juonut varjoaineen, saat poistua kuvantamisen osastolta. Tule takaisin sovittuun aikaan.

Tutkimuksessa sinulle laitetaan 100 millilitraa varjoainetta peräaukon kautta peräsuoleen. Makaan silloin tutkimuspöydällä vasemmalla kyljellä.

Kun varjoaine on laitettu, röntgenlääkäri antaa ohjeita ja ottaa röntgenkuvia. Istut kuvauksen ajan tutkimustelineen edessä ämpärillä.

Tutkimus kestää kokonaisuudessaan noin 2 tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Saat syödä normaalisti. Juo runsaasti nesteitä. Juominen edistää varjoaineen poistumista. Varjoaine saattaa värjätä ulosteen valkoiseksi.

Saat tutkimuksen vastaukset siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Muuta huomioitavaa

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.
Se sisältyy poliklinikkamaksuun.

Jos annettu tutkimusaika ei sovi sinulle,
ilmoita siitä mahdollisimman pian.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta,
voit soittaa meille:

Pori, Satasairaalan kuvantaminen,
puhelin 044 707 9202.

Palvelemme sinua puhelimitse
maanantaista perjantaihin
kello 8.00–14.30.