



Peräsuolen varjoainekuvaus eli defekografia

Tilauuskoodi

JG1JB Defekografia

Potilasohje

[Peräsuolen varjoainekuvaus eli defekografia](#)

Tutkimusindikaatio

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen toimintaa ja lantion pohjan mahdollista laskeutumista ulostamisen yhteydessä. Tutkimus tehdään, kun potilaalla on vaikeuksia ulostamisessa, tunne peräsuolen huonosta tyhjenemisestä tai peräsuolen esiinluiskahdus.

Tutkimuspyyntö ja ajanvaraus

Hoitava lääkäri tekee tutkimuspyynnön Lifecaren radi-lehdelle.

Aika varataan tutkimuspyynnön kautta Lifecaren ajanvarauskirjalta.

Valmistautuminen tutkimukseen

Esivalmisteluja ei ole. Potilas saa syödä ja juoda normaalisti.

Tutkimuksen suoritus

Potilas juo 1,5 tuntia ennen varsinaista tutkimusaikaa 700 ml varjoainetta suun kautta, jotta ohutsuolen loppuosaa, mahdollinen enterosele, voidaan kuvantaa.

HUOM! Tämän vuoksi potilaan on tultava kuvantamiseen 1,5 tuntia ennen ajanvarausjärjestelmästä otettua tutkimusaikaa. Potilaalle pitää siis ilmoittaa 1,5 tuntia aiempi aika kuin ajanvarausjärjestelmä antaa.

Tutkimuksessa laitetaan 100 ml varjoainetta peräaukon kautta peräsuoleen. Varjoaineen laiton jälkeen röntgenlääkäri ottaa röntgenkuvat. Kuvia otetaan levossa, ponnistaessa ja ulostaessa. Tutkimus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia.

Tutkimuksen kirjaus ja lausunto

Kuvantaminen kirjaa tarpeelliset tiedot tutkimuksesta ja sen kulusta Raduun.

Radiologin lausunto ja kuvalinkki Lifecaren Radilehdellä.