

Picoprep ® tyhjennysohje suolistoleikkaukseen tulevalle

Paksusuoli tyhjenetään ennen suolistoleikkausta.

Tyhjennys

Juo toimenpidettä edeltävänä päivänä kaksi annosta Picoprep ® tyhjennysainetta.

Osta tyhjennysaineet apteekista.

Ota ensimmäinen Picoprep ® -annos noin klo 8.00.

Pidä tyhjennysannosten välissä noin 6 tunnin tauko.

Ota toinen Picoprep ® -annos noin klo 14.00

Sekoita Picoprep ®- annos: 1 pussi/ 1,5 dl kylmää vettä.

Juo annos, kun liuos on hyvin liuennut.

Nestehukan välttämiseksi

Juo tyhjennyspäivänä runsaasti nesteitä tai liemiä, kuten vettä, liemikeittoa, teetä, kahvia, vaaleaa mehukeittoa tai hedelmämehua.

Leikkauspäivänä

Ole syömättä ja juomatta leikkausta edeltävästä yöstä klo 02.00 alkaen.

Ota sovitut aamulääkkeet pienen vesimäärän kanssa.

Juo esikäynnillä saamasi täydennysravintovalmiste kaksi tuntia ennen sairaalaan tuloa.

Mitään muuta juotavaa tai syötävää et saa ottaa.

Yhteystiedot

Kirurgian osasto 3

Puhelin 02 627 6230